

New 2-heterocyclyl-1,4-phenylenediamine derivatives - useful as developers in
oxidation hair dyes

Patent Assignee: WELLA AG
Inventors: BRAUN H; CHASSOT L

Patent Family

| Patent Number | Kind | Date | Application Number | Kind | Date | Week | Type |
|---------------|------|----------|--------------------|------|----------|--------|------|
| DE 29902262 | U1 | 19990506 | DE 99U2002262 | U | 19990209 | 199924 | B |
| DE 19812058 | C1 | 19991007 | DE 1012058 | A | 19980319 | 199945 | |
| EP 963982 | A2 | 19991215 | EP 99101072 | A | 19990125 | 200003 | |
| JP 11323165 | A | 19991126 | JP 9976869 | A | 19990319 | 200007 | |
| BR 9901020 | A | 20000509 | BR 991020 | A | 19990318 | 200033 | |
| US 6132475 | A | 20001017 | US 99250314 | A | 19990215 | 200054 | |
| EP 963982 | B1 | 20020313 | EP 99101072 | A | 19990125 | 200219 | |
| DE 59900969 | G | 20020418 | DE 500969 | A | 19990125 | 200227 | |
| | | | EP 99101072 | A | 19990125 | | |
| ES 2172264 | T3 | 20020916 | EP 99101072 | A | 19990125 | 200270 | |

Priority Applications (Number Kind Date): DE 1012058 A (19980319)

Patent Details


| Patent | Kind | Language | Page | Main IPC | Filing Notes |
|---|------|----------|------|-------------|------------------------------|
| DE 29902262 | U1 | | 119 | C07D-333/06 | |
| DE 19812058 | C1 | | | C07D-333/08 | |
| EP 963982 | A2 | G | | C07D-333/20 | |
| Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI | | | | | |
| JP 11323165 | A | | 26 | C09B-057/00 | |
| BR 9901020 | A | | | C07D-207/08 | |
| US 6132475 | A | | | A61K-007/13 | |
| EP 963982 | B1 | G | | C07D-333/20 | |
| Designated States (Regional): DE ES FR GB IT | | | | | |
| DE 59900969 | G | | | C07D-333/20 | Based on patent EP 963982 |
| ES 2172264 | T3 | | | C07D-333/20 | Based on patent EP 963982 |

Abstract:

DE 29902262 U

1,4-Phenylenediamine derivatives of formula (I) and their water-soluble salts are new: X = O, S, Se or NR₉; R₁-R₄ = H, 1-6C alkyl, 1-4C hydroxyalkyl, 2-4C dihydroxyalkyl or (1-4C)alkoxy(1-2C)alkyl, or NR₁R₂ or NR₃R₄ = 4- to 8-membered aliphatic ring, provided that at least two of R₁-R₄ are H; R₅ = H, halo, 1-4C alkyl, 1-4C hydroxyalkyl or 1-4C alkoxy; R₆-R₈ = H, OH, halo, CN, 1-4C alkoxy, 1-6C alkyl, 1-4C alkylthio, SH, NO₂, NH₂, alkylamino,

dialkylamino, CHO, COMe, COCF₃, SiMe₃, 1-4C hydroxyalkyl, 3-4C dihydroxyalkyl, CH=CHR₁₀, (CH₂)_pCOOR₁₁, (CH₂)_pR₁₂, C(R₁₃)=NR₁₄ or CH(R₁₆)NR₁₇R₁₈; p = 1-4; R₉ = H, 1-6C alkyl, 1-4C hydroxyalkyl, phenyl or acetyl; R₁₀ = H, OH, NO₂, NH₂, COOR₁₁ or COMe; R₁₁, R₁₃ and R₁₆ = H or 1-4C alkyl; R₁₂ = NH₂ or CN; R₁₄, R₁₇ and R₁₈ = H, OH, 1-4C alkyl, 1-4C hydroxyalkyl, 3-4C dihydroxyalkyl, phenyl, aminophenyl or hydroxyphenyl. USE - (I) are useful as developers in oxidation dyes for dyeing keratinic fibres, e.g. hides, feathers, wool or especially human hair.
Dwg.0/0





①9 BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫

Gebrauchsmuster

⑩

DE 299 02 262 U 1

②① Aktenzeichen: 299 02 262.5
②② Anmeldetag: 9. 2. 99
④⑦ Eintragungstag: 6. 5. 99
④③ Bekanntmachung
im Patentblatt: 17. 6. 99

⑤① Int. Cl.⁶:

C 07 D 333/06

C 07 D 307/38

C 07 D 295/04

C 07 F 7/18

D 06 P 3/08

D 06 P 1/32

C 07 D 345/00

A 61 K 7/13

DE 299 02 262 U 1

⑥⑥ Innere Priorität:

198 12 058. 3

19. 03. 98

⑦③ Inhaber:

Wella AG, 64295 Darmstadt, DE

⑤④ Neue Diaminobenzol-Derivate und diese Verbindungen enthaltende Färbemittel

DE 299 02 262 U 1

Beschreibung

Neue Diaminobenzol-Derivate und diese Verbindungen enthaltende Färbemittel

Die Erfindung betrifft neue p-Diaminobenzol-Derivate sowie diese Verbindungen enthaltende Mittel zum Färben von Keratinfasern.

Auf dem Gebiet der Färbung von Keratinfasern, insbesondere der Haarfärbung, haben Oxidationsfarbstoffe eine wesentliche Bedeutung erlangt. Die Färbung entsteht hierbei durch Reaktion bestimmter Entwicklersubstanzen mit bestimmten Kupplersubstanzen in Gegenwart eines geeigneten Oxidationsmittels. Als Entwicklersubstanzen werden hierbei insbesondere 2,5-Diaminotoluol, 2,5-Diaminophenylethylalkohol, p-Aminophenol und 1,4-Diaminobenzol eingesetzt, während als Kupplersubstanzen beispielsweise Resorcin, 4-Chlorresorcin, 1-Naphthol, 3-Aminophenol und Derivate des m-Phenylendiamins zu nennen sind.

An Oxidationsfarbstoffe, die zur Färbung menschlicher Haare verwendet werden, werden neben der Färbung in der gewünschten Intensität zahlreiche zusätzliche Anforderungen gestellt. So müssen die Farbstoffe in toxikologischer und dermatologischer Hinsicht unbedenklich sein und die erzielten Haarfärbungen eine gute Lichtechtheit, Dauerwellechtheit, Säureechtheit und Reibeechtheit aufweisen. Auf jeden Fall aber müssen solche Färbungen ohne Einwirkung von Licht, Reibung und chemischen Mitteln über einen Zeitraum von mindestens 4 bis 6 Wochen stabil bleiben. Außerdem ist es erforderlich, daß durch Kombination geeigneter


Entwicklersubstanzen und Kupplersubstanzen eine breite Palette verschiedener Farbnuancen erzeugt werden kann.

Mit den derzeit eingesetzten Färbemitteln ist es jedoch nicht möglich, die vorgenannten Anforderungen in allen Punkten zu erfüllen.

Es besteht daher weiterhin ein Bedürfnis nach neuen Entwickler-substanzen, welche die vorgenannten Anforderung in besonderem Masse erfüllen.

Hierzu wurde nun überraschenderweise gefunden, daß neue p-Diaminobenzol-Derivate gemäß der allgemeinen Formel (I) die an Entwicklersubstanzen gestellten Anforderungen in besonders hohem Masse erfüllen. So werden unter Verwendung dieser Entwickler-substanzen mit den meisten bekannten Kupplersubstanzen farbstärke Farbnancen erhalten, die außerordentlich lichtecht und waschecht sind.

Gegenstand der vorliegende Erfindung sind daher p-Diaminobenzol-Derivate der allgemeinen Formel (I) oder deren physiologisch verträgliche, wasserlösliche Salze,



worin

X gleich Sauerstoff, Schwefel, Selen oder N-R9 ist;

R1,R2,R3 und R4 unabhängig voneinander Wasserstoff, eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine C₁-C₄-Hydroxyalkylgruppe, eine C₂-C₄ Dihydroxyalkylgruppe oder eine C₁-C₄-Alkoxy-(C₁-C₂)-alkylgruppe darstellen oder R1 und R2 beziehungsweise R3 und R4 einen viergliedrigen bis achtegliedrigen aliphatischen Ring bilden, wobei mindestens 2 der Reste R1 bis R4 Wasserstoff darstellen;

R5 gleich Wasserstoff, einem Halogenatom, einer C₁-C₄-Alkylgruppe, einer C₁-C₄ -Hydroxyalkylgruppe oder einer C₁-C₄-Alkoxygruppe ist;

R6 gleich Wasserstoff, einer Hydroxygruppe, einem Halogenatom, einer Cyanogruppe, einer C₁-C₄-Alkoxygruppe, einer C₁-C₆ -Alkylgruppe, einer C₁-C₄-Alkylthioethergruppe, einer Mercaptogruppe, einer Nitrogruppe, einer Aminogruppe, einer Alkylaminogruppe, einer Dialkylaminogruppe, einer -C(O)H-Gruppe, einer -C(O)CH₃-Gruppe, einer -C(O)CF₃-Gruppe, einer -Si(CH₃)₃-Gruppe, einer C₁-C₄-Hydroxyalkylgruppe, einer C₃-C₄-Dihydroxyalkylgruppe, einer -CH=CHR₁₀-Gruppe, einer -(CH₂)_p-CO₂R₁₁-Gruppe oder einer -(CH₂)_p-R₁₂-Gruppe mit p=1,2,3 oder 4, einer -C(R₁₃)=NR₁₄-Gruppe oder einer C(R₁₆)H-NR₁₇R₁₈-Gruppe ist;

R7 und R8 unabhängig voneinander gleich Wasserstoff, einem Halogenatom, einer Cyanogruppe, einer Hydroxygruppe, einer C₁-C₄ -Alkoxygruppe, einer C₁-C₆ Alkylgruppe, einer C₁-C₄-Alkylthioethergruppe, einer Mercaptogruppe, einer Nitrogruppe, einer Aminogruppe, einer Alkylaminogruppe, einer Dialkylaminogruppe, einer -C(O)H-Gruppe, einer -C(O)CH₃-Gruppe, einer -C(O)CF₃-Gruppe, einer -Si(CH₃)₃-Gruppe, einer C₁-C₄-Hydroxyalkylgruppe, einer C₃-C₄-Dihydroxyalkylgruppe, einer -CH=CHR₁₀-Gruppe, einer -(CH₂)_p-CO₂R₁₁-Gruppe oder einer

$-(CH_2)_p$ -R12-Gruppe mit $p=1,2,3$ oder 4 , einer $-C(R13)=NR14$ -Gruppe oder einer $C(R16)H-NR17R18$ -Gruppe sind;


R9 gleich Wasserstoff, einer C_1 - C_6 -Alkylgruppe, einer C_1 - C_4 -Hydroxyalkylgruppe, einer Phenylgruppe oder einer Acetylgruppe ist;

R10 gleich Wasserstoff, einer Hydroxygruppe, einer Nitrogruppe, einer Aminogruppe, einer $-CO_2R11$ -Gruppe oder einer $-C(O)CH_3$ -Gruppe ist;

R11, R13 und R16 unabhängig voneinander gleich Wasserstoff oder einer C_1 - C_4 -Alkylgruppe sind;

R12 gleich einer Aminogruppe oder einer Nitrilgruppe ist;

R14, R17 und R18 unabhängig voneinander gleich Wasserstoff, einer Hydroxygruppe, einer C_1 - C_4 -Alkylgruppe, einer C_1 - C_4 -Hydroxyalkylgruppe, einer C_3 - C_4 -Dihydroxyalkylgruppe oder einem Rest der Formel (II) sind



und

R15 gleich Wasserstoff, einer Aminogruppe oder einer Hydroxygruppe ist.

Als Verbindungen der Formel (I) können beispielweise die folgenden Verbindungen genannt werden:

2,5-Diamino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-methylamino-(3-thienyl)benzol;
 5-Amino-2-methylamino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-dimethylamino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-dimethylamino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)amino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-(2-hydroxyethyl)amino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)methylamino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-(2-hydroxyethyl)-

methylamino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-(2,3-dihydroxypropyl)amino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-(2,3-dihydroxypropyl)amino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2,3-dihydroxypropyl)amino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2,3-dihydroxypropyl)amino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-(2,3-dihydroxypropyl)methylamino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-(2,3-dihydroxypropyl)methylamino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-(2-methoxyethyl)amino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-(2-methoxyethyl)amino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-methoxyethyl)amino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-methoxyethyl)amino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-(2-methoxyethyl)methylamino-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-(2-methoxyethyl)methylamino-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-methylamino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-methylamino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-dimethylamino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-dimethylamino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)amino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-(2-hydroxyethyl)amino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)methylamino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-(2-hydroxyethyl)methylamino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-(2,3-dihydroxypropyl)amino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-(2,3-dihydroxypropyl)amino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2,3-dihydroxypropyl)amino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2,3-dihydroxypropyl)amino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-(2,3-dihydroxypropyl)methylamino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-(2,3-dihydroxypropyl)methylamino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-(2-methoxyethyl)amino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-(2-methoxyethyl)amino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-methoxyethyl)amino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-methoxyethyl)amino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-(2-methoxyethyl)methylamino-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-(2-methoxyethyl)methylamino-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-methylamino-(pyrrol-3-yl)benzol;

5-Amino-2-methylamino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-dimethylamino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-dimethylamino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2-hydroxyethyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)methylamino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2-hydroxyethyl)methylamino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2,3-dihydroxypropyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2,3-dihydroxypropyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2,3-dihydroxypropyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2,3-dihydroxypropyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2,3-dihydroxypropyl)methylamino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2,3-dihydroxypropyl)methylamino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2-methoxyethyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2-methoxyethyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-methoxyethyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-methoxyethyl)amino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2-methoxyethyl)methylamino-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2-methoxyethyl)methylamino-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-methylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-methylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-dimethylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-dimethylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2-hydroxyethyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)methylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2-hydroxyethyl)methylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2,3-dihydroxypropyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2,3-dihydroxypropyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol;

pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2,3-dihydroxypropyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2,3-dihydroxypropyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2,3-dihydroxypropyl)methylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2,3-dihydroxypropyl)-methylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2-methoxyethyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2-methoxyethyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-methoxyethyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-methoxyethyl)amino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-(2-methoxyethyl)methylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-(2-methoxyethyl)methylamino-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-3-methyl-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-3-methyl-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-3-methyl-(3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-3-chlor-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-3-chlor-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-3-chlor-(3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-4-methyl-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-4-methyl-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-4-methyl-(3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-4-chlor-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-4-chlor-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-4-chlor-(3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-5-methyl-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-5-methyl-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-5-methyl-(3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-5-chlor-(3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-5-chlor-(3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-5-chlor-(3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-3-methyl-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-3-methyl-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-3-methyl-(3-furyl)benzol;

2,5-Diamino-3-chlor-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)-amino-3-chlor-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-3-chlor-(3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-4-methyl-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-4-methyl-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-4-methyl-(3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-4-chlor-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-4-chlor-(3-furyl)-benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-4-chlor-(3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-5-methyl-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)-amino-5-methyl-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-5-methyl-(3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-5-chlor-(3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-5-chlor-(3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-5-chlor-(3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-3-methyl-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-3-methyl-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-3-methyl-(pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-3-chlor-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)-amino-3-chlor-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-3-chlor-(pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-4-methyl-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-4-methyl-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-4-methyl-(pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-4-chlor-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)-amino-4-chlor-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-4-chlor-(pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-5-methyl-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-5-methyl-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-5-methyl-(pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-5-chlor-(pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-5-chlor-(pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-5-chlor-(pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-3-methyl-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-3-methyl-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol;

5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-3-methyl-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)-benzol; 2,5-Diamino-3-chlor-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-3-chlor-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-3-chlor-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-4-methyl-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-4-methyl-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-4-methyl-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-4-chlor-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-4-chlor-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-4-chlor-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-5-methyl-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-5-methyl-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-5-methyl-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-5-chlor-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-5-chlor-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-5-chlor-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-(2-methyl-3-thienyl) benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)-amino-(2-methyl-3-thienyl) benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-methyl-3-thienyl) benzol; 2,5-Diamino-(2-methyl-3-furyl) benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-methyl-3-furyl) benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-methyl-3-furyl) benzol; 2,5-Diamino-(4-methyl-3-thienyl) benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-methyl-3-thienyl) benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-methyl-3-thienyl)- benzol; 2,5-Diamino-(4-methyl-3-furyl) benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-methyl-3-furyl) benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)-amino-(4-methyl-3-furyl) benzol; 2,5-Diamino-(5-methyl-3-thienyl)- benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-methyl-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-methyl-3-thienyl) benzol;

2,5-Diamino-(5-methyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)-
 amino-(5-methyl-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-
 methyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(2-ethyl-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-
 di(2-hydroxyethyl)amino-(2-ethyl-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-
 hydroxyethyl)amino-(2-ethyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(2-ethyl-3-
 furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-ethyl-3-furyl)- benzol;
 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-ethyl-3-furyl)benzol;
 2,5-Diamino-(4-ethyl-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-
 (4-ethyl-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-ethyl-3-
 thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(4-ethyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-
 hydroxyethyl)amino-(4-ethyl-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-
 hydroxyethyl)amino-(4-ethyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-ethyl-3-
 thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-ethyl-3-
 thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-ethyl-3-
 thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-ethyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-
 hydroxyethyl)amino-(5-ethyl-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxy-
 ethyl)amino-(5-ethyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(2-dimethylamino-3-
 thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-dimethylamino-3-
 thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-dimethylamino-3-
 thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(2-dimethylamino-3-furyl)benzol;
 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-dimethylamino-3-furyl)benzol;
 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-dimethylamino-3-furyl)benzol;
 2,5-Diamino-(4-dimethylamino-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxy-
 ethyl)amino-(4-dimethylamino-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxy-
 ethyl)amino-(4-dimethylamino-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(4-dimethyl-
 amino-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-dimethyl-
 amino-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-dimethyl-
 amino-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-dimethylamino-3-thienyl)benzol;

2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-dimethylamino-3-thienyl)benzol;
5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-dimethylamino-3-thienyl)benzol;
2,5-Diamino-(5-dimethylamino-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxy-ethyl)amino-(5-dimethylamino-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxy-ethyl)amino-(5-dimethylamino-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(2-formyl-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-formyl-3-thienyl)-benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-formyl-3-thienyl)benzol;
2,5-Diamino-(2-formyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)-amino-(2-formyl-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-formyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(4-formyl-3-thienyl)benzol;
2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-formyl-3-thienyl)benzol;
5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-formyl-3-thienyl)benzol;
2,5-Diamino-(4-formyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxy-ethyl)amino-(4-formyl-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxy-ethyl)amino-(4-formyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-formyl-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-formyl-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-formyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-formyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-formyl-3-furyl)benzol;
5-Amino-2-di(2-hydroxy-ethyl)amino-(5-formyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(2-acetyl-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-acetyl-3-thienyl)- benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-acetyl-3-thienyl)benzol;
2,5-Diamino-(2-acetyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)-amino-(2-acetyl-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-acetyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(4-acetyl-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-acetyl-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-acetyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(4-acetyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-acetyl-3-furyl)benzol;

5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-acetyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-acetyl-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-acetyl-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-acetyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-acetyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-acetyl-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-acetyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(2-aminomethyl-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-aminomethyl-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-aminomethyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(2-aminomethyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-aminomethyl-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-aminomethyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(4-aminomethyl-3-thienyl)-benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-aminomethyl-3-thienyl)-benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-aminomethyl-3-thienyl)-benzol; 2,5-Diamino-(4-aminomethyl-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-aminomethyl-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-aminomethyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-aminomethyl-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-aminomethyl-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-aminomethyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-aminomethyl-3-furyl)-benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-aminomethyl-3-furyl)-benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-aminomethyl-3-furyl)-benzol; 2,5-Diamino-(2-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-thienyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(2-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(2-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxy-ethyl)amino-(2-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-

hydroxyethyl)amino-(2-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-furyl)benzol;
 2,5-Diamino-(4-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-thienyl)-benzol;
 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-(2-hydroxyethyl(imino))-methylen-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(4-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxy-ethyl)amino-(4-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-furyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(4-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-furyl)benzol;
 2,5-Diamino-(5-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-thienyl)-benzol;
 2-Amino-5-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-(2-hydroxyethyl(imino))-methylen-3-thienyl)benzol; 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-(5-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-furyl)benzol; 2-Amino-5-di(2-hydroxy-ethyl)amino-(5-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-furyl)benzol und 5-Amino-2-di(2-hydroxyethyl)amino-(5-(2-hydroxyethyl(imino))methylen-3-furyl)benzol.

Bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), bei denen (i) eine oder mehrere der Restgruppen R5, R6, R7 und R8 gleich Wasserstoff sind und/oder (ii) R1, R2, R3 und R4 gleichzeitig Wasserstoff bedeuten und/oder (iii) R7 gleich Wasserstoff und R6 gleich Wasserstoff, -C(O)H, -C(O)CH₃, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Hydroxyalkyl (insbesondere R6=R7=Wasserstoff) ist.

Insbesondere sind die folgenden Verbindungen zu nennen:

2,5-Diamino-1-(5-chlor-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(3-furyl)benzol;
 2,5-Diamino-1-(2-acetyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-1-(2-formyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(4-formyl-3-thienyl)-benzol; 2,5-Diamino-1-(2-formyl-3-furyl)benzol; 2,5-

Diamino-1-(4-formyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(5-methyl-3-thienyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(5-methyl-3-thienyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-nitropropenyl)-3-thienyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(3-furyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(4-formyl-3-thienyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2-hydroxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-pyrrolidinomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(dimethylaminoethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3-ethoxypropyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(methoxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-trifluormethyl-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3-methoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(O,N-dimethyl-hydroxylaminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2,4-dimethoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-phenoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxybenzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxyphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxy-butyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-3-fluor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-(1-phenyl-ethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2-furyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2-pyridyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-morpholinomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-4-benzyl-piperazinomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3-carboxamid-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,

2,5-Diamino-1-(4-diethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(pyridin-4yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(4-morpholino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(1-(2-hydroxyethyl))propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-cyclopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
N-(2-([4-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino)-ethyl)-
acetamid, 2,5-Diamino-1-(4-cyclohexylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(o-tolyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-cyclohexyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(2,6-dimethyl-morpholino)methyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-piperidino)methyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(3-(1-hydroxyethyl)phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3-methylmercapto-phenyl)aminomethyl-3-
thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-isopropyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-pentylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(dibutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-isopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(N-Cyclopropylmethyl-N-propyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxy)piperidinomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(fluorenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(4-Dimethylamino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(indanyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,


2,5-Diamino-1-(4-(3-fluor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(4-methyl-piperazino)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(4-tert-butyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(2-chlor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(napht-1-yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(4-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 4-[[4-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino]-benzoesäure-
 methyl-ester und 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol, wobei das 2,5-Diamino-
 1-(3-thienyl)benzol besonders bevorzugt ist.

Die Verbindungen der Formel (I) können sowohl als freie Basen als auch
 in Form ihrer physiologisch verträglichen Salze mit anorganischen oder
 organischen Säuren, wie zum Beispiel Salzsäure, Schwefelsäure,
 Phosphorsäure, Essigsäure, Propionsäure, Milchsäure oder
 Zitronensäure, eingesetzt werden.


Die Herstellung der erfindungsgemäßen Diaminobenzol-Derivate der
 Formel (I) kann unter Verwendung von bekannten Syntheseverfahren
 erfolgen. Die Synthese der erfindungsgemäßen Verbindungen kann
 beispielsweise wie folgt durchgeführt werden:

Entweder a) durch eine Tetrakis(triphenylphosfin)palladium(0) katalysierte
 Kupplung eines substituierten Benzols der Formel (II)

17



mit einer Heteroarylverbindung der Formel (III)



worin

Ra die Bedeutung einer Schutzgruppe, wie sie zum Beispiel in dem Kapitel „Protective Groups“ in Organic Synthesis, Kapitel 7, Wiley Interscience, 1991 beschrieben wird,

Rb die Bedeutung NR₁Ra oder NO₂ hat,


Rc die Bedeutung Halogen und Rd die Bedeutung B(OH)₂

beziehungsweise Rc die Bedeutung B(OH)₂ und Rd die Bedeutung Halogen hat, und


X, R₁, R₅, R₆, R₇ und R₈ die in Formel (I) genannte Bedeutung haben, und anschließende Abspaltung der Schutzgruppe oder Abspaltung der Schutzgruppe und Reduktion der Nitrogruppe;

oder b) durch eine Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) katalysierte Kupplung eines substituierten Benzols der Formel (IV)

18



mit einer Heteroarylverbindung der Formel (III)



worin

Rc die Bedeutung Halogen und Rd die Bedeutung $B(OH)_2$


beziehungsweise Rc die Bedeutung $B(OH)_2$ und Rd die Bedeutung

Halogen hat, und

X, R5, R6, R7 und R8 die in Formel (I) angegebene Bedeutung haben,

anschließende Substitution des so erhaltenen substituierten Benzols der

Formel (V)



mit einem Amin der Formel HNR_1R_2 ,

worin R_1, R_2 die in Formel (I) genannte Bedeutung haben, und Reduktion

der Nitrogruppe.

Die erfindungsgemäßen Diaminobenzol-Derivate der Formel (I) sind in Wasser gut löslich und ermöglichen Färbungen mit hoher Farbtintensität und ausgezeichneter Farbechtheit, insbesondere was die Lichtechtheit, Waschechtheit und Reibeechtheit anbetrifft. Die Verbindungen der Formen (I) weisen weiterhin eine ausgezeichnete Lagerstabilität, insbesondere als Bestandteil der nachfolgend beschriebenen Färbemittel, auf.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher Mittel zum oxidativen Färben von Keratinfasern, wie zum Beispiel Haaren, Pelzen, Federn oder Wolle, insbesondere menschlichen Haaren, auf der Basis einer Entwicklersubstanz-Kupplersubstanz-Kombination, welche als Entwicklersubstanz mindestens ein Diaminobenzol-Derivat der Formel (I) enthalten.

Das Diaminobenzol-Derivat der Formel (I) ist in dem erfindungsgemäßen Färbemittel in einer Menge von etwa 0,005 bis 20 Gewichtsprozent enthalten, wobei eine Menge von etwa 0,01 bis 5,0 Gewichtsprozent und insbesondere 0,1 bis 2,5 Gewichtsprozent bevorzugt ist.

Als Kupplersubstanzen kommen vorzugsweise 2,6-Diamino-pyridin, 2-Amino-4-[(2-hydroxyethyl)amino]-anisol, 2,4-Diamino-1-fluor-5-methylbenzol, 2,4-Diamino-1-methoxy-5-methylbenzol, 2,4-Diamino-1-ethoxy-5-methylbenzol, 2,4-Diamino-1-(2-hydroxyethoxy)-5-methylbenzol, 2,4-Di[(2-hydroxyethyl)amino]-1,5-dimethoxybenzol, 2,3-Diamino-6-methoxy-pyridin, 3-Amino-6-methoxy-2-(methylamino)-pyridin, 2,6-Diamino-3,5-dimethoxy-pyridin, 3,5-Diamino-2,6-dimethoxy-pyridin, 1,3-Diaminobenzol, 2,4-Diamino-1-(2-hydroxyethoxy)-benzol, 2,4-Diamino-1,5-di(2-

hydroxyethoxy)-benzol, 1-(2-Aminoethoxy)-2,4-diamino-benzol, 2-Amino-1-(2-hydroxyethoxy)-4-methylamino-benzol, 2,4-Diaminophenoxy-essigsäure, 3-[Di(2-hydroxyethyl)amino]-anilin, 4-Amino-2-di[(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethoxy-benzol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-phenol, 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-anilin, 3-[(2-Aminoethyl)amino]-anilin, 1,3-Di(2,4-diaminophenoxy)-propan, Di(2,4-diaminophenoxy)-methan, 1,3-Diamino-2,4-dimethoxy-benzol, 2,6-Bis(2-hydroxyethyl)amino-toluol, 4-Hydroxyindol, 3-Dimethylamino-phenol, 3-Diethylamino-phenol, 5-Amino-2-methyl-phenol, 5-Amino-4-fluor-2-methyl-phenol, 5-Amino-4-methoxy-2-methyl-phenol, 5-Amino-4-ethoxy-2-methyl-phenol, 3-Amino-2,4-dichlor-phenol, 5-Amino-2,4-dichlor-phenol, 3-Amino-2-methyl-phenol, 3-Amino-2-chlor-6-methyl-phenol, 3-Amino-phenol, 2-[(3-Hydroxyphenyl)amino]-acetamid, 5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methyl-phenol, 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-phenol, 3-[(2-Methoxyethyl)amino]-phenol, 5-Amino-2-ethyl-phenol, 2-(4-Amino-2-hydroxyphenoxy)-ethanol, 5-[(3-Hydroxypropyl)amino]-2-methyl-phenol, 3-[(2,3-Dihydroxypropyl)amino]-2-methyl-phenol, 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methyl-phenol, 2-Amino-3-hydroxy-pyridin, 5-Amino-4-chlor-2-methyl-phenol, 1-Naphthol, 1,5-Dihydroxy-naphthalin, 1,7-Dihydroxy-naphthalin, 2,3-Dihydroxy-naphthalin, 2,7-Dihydroxy-naphthalin, 2-Methyl-1-naphthol-acetat, 1,3-Dihydroxy-benzol, 1-Chlor-2,4-dihydroxy-benzol, 2-Chlor-1,3-dihydroxy-benzol, 1,2-Dichlor-3,5-dihydroxy-4-methyl-benzol, 1,5-Dichlor-2,4-dihydroxy-benzol, 1,3-Dihydroxy-2-methyl-benzol, 3,4-Methylendioxy-phenol, 3,4-Methylendioxy-anilin, 5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-1,3-benzodioxol, 6-Brom-1-hydroxy-3,4-methylendioxy-benzol, 3,4-Diamino-benzoesäure, 3,4-Dihydro-6-hydroxy-1,4(2H)-benzoxazin, 6-Amino-3,4-dihydro-1,4(2H)-benzoxazin, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolon, 5,6-

Dihydroxy-indol, 5,6-Dihydroxy-indolin, 5-Hydroxy-indol, 6-Hydroxy-indol, 7-Hydroxy-indol und 2,3-Indolindion in Betracht.

Obwohl die vorteilhaften Eigenschaften der hier beschriebenen Diaminobenzol-Derivate der Formel (I) es nahelegen, diese als alleinige Entwicklersubstanz zu verwenden, ist es selbstverständlich auch möglich, die Diaminobenzol-Derivate der Formel (I) gemeinsam mit bekannten Entwicklersubstanzen, wie zum Beispiel 1,4-Diaminobenzol, 2,5-Diaminotoluol, 2,5-Diaminophenylethylalkohol, 4-Aminophenol und seinen Derivaten, beispielsweise 4-Amino-3-methylphenol, 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazol oder Tetraaminopyrimidinen, einzusetzen.

Die Kupplersubstanzen und Entwicklersubstanzen können in dem erfindungsgemäßen Färbemittel jeweils einzeln oder im Gemisch miteinander enthalten sein, wobei die Gesamtmenge an Kupplersubstanzen und Entwicklersubstanzen in dem erfindungsgemäßen Färbemittel (bezogen auf die Gesamtmenge des Färbemittels) jeweils etwa 0,005 bis 20 Gewichtsprozent, vorzugsweise etwa 0,01 bis 5,0 Gewichtsprozent und insbesondere 0,1 bis 2,5 Gewichtsprozent, beträgt.

Die Gesamtmenge der in dem hier beschriebenen Färbemittel enthaltenen Entwicklersubstanz-Kupplersubstanz-Kombination beträgt vorzugsweise etwa 0,01 bis 20 Gewichtsprozent, wobei eine Menge von etwa 0,02 bis 10 Gewichtsprozent und insbesondere 0,2 bis 6,0 Gewichtsprozent besonders bevorzugt ist. Die Entwicklersubstanzen und Kupplersubstanzen werden im allgemeinen in etwa äquimolaren Mengen eingesetzt; es ist jedoch nicht nachteilig, wenn die Entwicklersubstanzen

diesbezüglich in einem gewissen Überschuß oder Unterschuß vorhanden sind.

Weiterhin kann das erfindungsgemäße Färbemittel zusätzlich andere Farbkomponenten, beispielsweise 6-Amino-2-methylphenol und 2-Amino-5-methylphenol, sowie ferner übliche direktziehende Farbstoffe, zum Beispiel Triphenylmethanfarbstoffe wie 4-[(4'-aminophenyl)-(4"-imino-2",5"-cyclohexadien-1"-yliden)-methyl]-2-methylaminobenzol-monohydrochlorid (C.I. 42 510) und 4-[(4'-amino-3'-methyl-phenyl)-(4"-imino-3"-methyl-2",5"-cyclohexadien-1"-yliden)-methyl]-2-methyl-aminobenzol monohydrochlorid (C.I. 42 520), aromatische Nitrofarbstoffe wie 4-(2'-hydroxyethyl)amino-nitrotoluol, 2-Amino-4,6-dinitrophenol, 2-Amino-5-(2'-hydroxyethyl)amino-nitrobenzol, 2-Chlor-6-(ethylamino)-4-nitrophenol, 4-Chlor-N-(2-hydroxyethyl)-2-nitroanilin, 5-Chlor-2-hydroxy-4-nitroanilin, 2-Amino-4-chlor-6-nitrophenol und 1-[(2'-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzol, Azofarbstoffe wie 6-[(4'-Aminophenyl)azo]-5hydroxy-naphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz (C.I. 14 805) und Dispersionsfarbstoffe wie beispielsweise 1,4-Diaminoanthrachinon und 1,4,5,8-Tetraamino-antrachinon, enthalten. Die Färbemittel können diese Farbkomponenten in einer Menge von etwa 0,1 bis 4,0 Gewichtsprozent enthalten.

Selbstverständlich können die Kupplersubstanzen und Entwicklersubstanzen sowie die anderen Farbkomponenten, sofern es Basen sind, auch in Form der physiologisch verträglichen Salze mit organischen oder anorganischen Säuren, wie beispielsweise Salzsäure oder Schwefelsäure, beziehungsweise - sofern sie aromatische OH-Gruppen besitzen - in Form der Salze mit Basen, zum Beispiel als Alkaliphenolate, eingesetzt werden.

Darüber hinaus können in den Färbemitteln, falls diese zur Färbung von Haaren verwendet werden sollen, noch weitere übliche kosmetische Zusätze, beispielsweise Antioxidantien wie Ascorbinsäure, Thioglykolsäure oder Natriumsulfit, sowie Parfümöle, Komplexbildner, Netzmittel, Emulgatoren, Verdicker und Pflegestoffe enthalten sein. Die Zubereitungsform des erfindungsgemäßen Färbemittels kann beispielsweise eine Lösung, insbesondere eine wäßrige oder wäßrig-alkoholische Lösung sein. Die besonders bevorzugten Zubereitungsformen sind jedoch eine Creme, ein Gel oder eine Emulsion. Ihre Zusammensetzung stellt eine Mischung der Farbstoffkomponenten mit den für solche Zubereitungen üblichen Zusätzen dar.

Übliche Zusätze in Lösungen, Cremes, Emulsionen oder Gelen sind zum Beispiel Lösungsmittel wie Wasser, niedere aliphatische Alkohole, beispielsweise Ethanol, Propanol oder Isopropanol, Glycerin oder Glykole wie 1,2-Propylenglykol, weiterhin Netzmittel oder Emulgatoren aus den Klassen der anionischen, kationischen, amphoteren oder nichtionogenen oberflächenaktiven Substanzen wie zum Beispiel Fettalkoholsulfate, oxethylierte Fettalkoholsulfate, Alkylsulfonate, Alkylbenzolsulfonate, Alkyltrimethylammoniumsalze, Alkylbetaine, oxethylierte Fettalkohole, oxethylierte Nonylphenole, Fettsäurealkanolamide und oxethylierte Fettsäureester ferner Verdicker wie höhere Fettalkohole, Stärke, Cellulosederivate, Petrolatum, Paraffinöl und Fettsäuren, sowie außerdem Pflegestoffe wie kationische Harze, Lanolinderivate, Cholesterin, Pantothenensäure und Betain. Die erwähnten Bestandteile werden in den für solche Zwecke üblichen Mengen verwendet, zum Beispiel die Netzmittel und Emulgatoren in Konzentrationen von etwa 0,5 bis 30 Gewichts-

prozent, die Verdicker in einer Menge von etwa 0,1 bis 25 Gewichtsprozent und die Pflegestoffe in einer Konzentration von etwa 0,1 bis 5,0 Gewichtsprozent.

Je nach Zusammensetzung kann das erfindungsgemäße Färbemittel schwach sauer, neutral oder alkalisch reagieren. Insbesondere weist es einen pH-Wert von 6,8 bis 11,5 auf, wobei die basische Einstellung vorzugsweise mit Ammoniak erfolgt. Es können aber auch organische Amine, zum Beispiel Monoethanolamin und Triethanolamin, oder auch anorganische Basen wie Natriumhydroxid und Kaliumhydroxid Verwendung finden. Für eine pH-Einstellung im sauren Bereich kommen anorganische oder organische Säuren, zum Beispiel Phosphorsäure, Essigsäure Zitronensäure oder Weinsäure, in Betracht.

Für die Anwendung zur oxidativen Färbung von Haaren vermischt man das vorstehend beschriebene Färbemittel unmittelbar vor dem Gebrauch mit einem Oxidationsmittel und trägt eine für die Haarfärbebehandlung ausreichende Menge, je nach Haarfülle, im allgemeinen etwa 60 bis 200 Gramm, dieses Gemisches auf das Haar auf.

Als Oxidationsmittel zur Entwicklung der Haarfärbung kommen hauptsächlich Wasserstoffperoxid oder dessen Additionsverbindungen an Harnstoff, Melamin, Natriumborat oder Natriumcarbonat in Form einer 3- bis 12prozentigen, vorzugsweise 6prozentigen, wässrigen Lösung, aber auch Luftsauerstoff in Betracht. Wird eine 6prozentige Wasserstoffperoxid-Lösung als Oxidationsmittel verwendet, so beträgt das Gewichtsverhältnis zwischen Haarfärbemittel und Oxidationsmittel 5:1 bis 1:2, vorzugeweise jedoch 1:1. Größere Mengen an Oxidationsmittel

werden vor allem bei höheren Farbstoffkonzentrationen im Haarfärbemittel, oder wenn gleichzeitig eine stärkere Bleichung des Haares beabsichtigt ist, verwendet. Man läßt das Gemisch bei 15 bis 50 Grad Celsius etwa 10 bis 45 Minuten lang, vorzugsweise 30 Minuten lang, auf das Haar einwirken, spült sodann das Haar mit Wasser aus und trocknet es. Gegebenenfalls wird im Anschluß an diese Spülung mit einem Shampoo gewaschen und eventuell mit einer schwachen organischen Säure, wie zum Beispiel Zitronensäure oder Weinsäure, nachgespült. Anschließend wird das Haar getrocknet.

Die erfindungsgemäßen Haarfärbemittel mit einem Gehalt an Diaminobenzol-Derivaten der Formel (I) als Entwicklersubstanz ermöglichen Haarfärbungen mit ausgezeichneter Farbechtheit, insbesondere was die Lichtechtheit, Waschechtheit und Reibeechtheit anbetrifft. Hinsichtlich der färberischen Eigenschaften bieten die erfindungsgemäßen Haarfärbemittel je nach Art und Zusammensetzung der Farbkomponenten eine breite Palette verschiedener Farbnuancen, welche sich von blonden über braune, purpurne, violette bis hin zu blauen und schwarzen Farbtönen erstreckt. Hierbei zeichnen sich die Farbtöne durch ihre besondere Farbintensität aus. Die sehr guten färberischen Eigenschaften der Haarfärbemittel gemäß der vorliegenden Anmeldung zeigen sich weiterhin darin, daß diese Mittel eine Anfärbung von ergrauten, chemisch nicht vorgeschädigten Haaren problemlos und mit guter Deckkraft ermöglichen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen den Gegenstand der Erfindung näher erläutern, ohne ihn darauf zu beschränken.

Beispiele

Beispiele 1: Synthese von 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzolen (Allgemeine Synthesevorschrift)

A. Synthese von 2,5-tert.-Butyloxycarbonylamino-brombenzol

15,65 g (0,07 mol) Brom-p-phenylendiamin-Hydrochlorid und 32,7 g (0,15 mol) Di-tert.-butyl-dicarbonat werden in einer Mischung von 250 ml 2N Natriumhydroxide und 250 ml Trifluortoluol gelöst und auf 45 °C erwärmt. Die Reaktionmischung wird 3 Tage gerührt. Schrittweise werden noch insgesamt 30 g (0,14 mol) Di-tert.-butyl-dicarbonat zugegeben. Anschließend wird die organische Schicht abgetrennt und die wäßrige Phase noch zweimal mit 100 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten Extrakte werden eingedampft und der Rückstand in 200 ml Hexan aufgenommen. Der Niederschlag wird abfiltriert und mit 50 ml Hexan nachgewaschen. Es werden 18,6 g (82 % der Theorie) 2,5-tert.-Butyloxycarbonylamino-brombenzol mit einem Schmelzpunkt von 130 °C erhalten.

B. Synthese von 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzolen

3,3 g (0,01 mol) 2,5-tert.-Butyloxycarbonylamino-brombenzol aus Stufe A und 0,013 mol der entsprechenden Borsäure werden unter Argon in 70 ml 1,2-Dimethoxyethan gelöst. Anschließend werden 0,5 g Tetrakis-(triphenylphosphin)-palladium (0,0005 mol) und 13 ml 2N Kaliumcarbonatlösung zugegeben und die Reaktionsmischung auf 80 °C erwärmt. Nach Beendigung der Reaktion wird die Reaktionsmischung in 100 ml Essigsäureethylester gegossen, die organische Phase mit verdünnter

Natronlauge extrahiert und sodann mit Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer abdestilliert und der Rückstand an Kieselgel mit Petrolether/Essigsäureethylester (9:1) gereinigt. Das so erhaltene Produkt wird in 40 ml Ethanol auf 50 °C erwärmt.

Anschließend werden zur Herstellung des Hydrochlorides 15 ml einer 2,9 molaren ethanolischen Salzsäurelösung zugetropft. Der Niederschlag wird abfiltriert, zweimal mit 10 ml Ethanol gewaschen und sodann getrocknet.

2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol-dihydrochlorid

Verwendete Borsäure: Thiophen-3-borsäure

Ausbeute: 2,0 g (75 % der Theorie)

Schmelzpunkt: 245 °Celsius (farblose Kristalle)

CHN-Analyse:

| (C ₁₀ H ₁₂ N ₂ Cl ₂ S) | % C | % H | % N |
|--|-------|------|-------|
| berechnet: | 45,64 | 4,60 | 10,64 |
| gefunden: | 45,55 | 4,66 | 10,64 |

C. Synthese von N,N'-Bis(tert-Butoxycarbonyl)-2,5-diamino-1-phenylborsäure

Die N,N'-Bis(tert-Butoxycarbonyl)-2,5-diamino-1-phenylborsäure werden durch Umsetzung von N,N'-Bis(tert-Butoxycarbonyl)-2,5-diamino-1-brombenzol mit tert-Butyllithium und Trimethylborate dargestellt. Die experimentelle Vorschrift dieser Herstellungsmethode wird von J. M. Tour und J. J. S: Lamba in J. Am. Chem. Soc. 1994, 116 Seite 11723 beschrieben.

D. Synthese von 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzolen und 2,5-Diamino-1-(3-furyl)-benzol

0,035 g (0,0001 mol) 2,5-tert.-Butyloxycarbonylamino-1-phenylborsäure aus Stufe C und 0,00015 mol des entsprechenden Bromderivates werden unter Argon in 10 ml 1,2-Dimethoxyethan gelöst. Anschließend werden 0,005 g Tetrakis-(triphenylphosphin)-palladium (0,000005 mol) und 0,13 ml 2N Kaliumcarbonat-lösung zugegeben und die Reaktionsmischung auf 80 °C erwärmt. Nach Beendigung der Reaktion wird die Reaktionsmischung in 10 ml Essigsäureethylester gegossen, die organische Phase mit verdünnter Natronlauge extrahiert und sodann mit Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer abdestilliert und der Rückstand an Kieselgel mit Petrolether/Essigsäureethylester (9:1) gereinigt. Das so erhaltene Produkt wird in 4 ml Ethanol auf 50 °C erwärmt.

Anschließend werden zur Herstellung des Hydrochlorides 1,5 ml einer 2,9 molaren ethanolische Salzsäurelösung zugetropft. Der Niederschlag wird abfiltriert, zweimal mit 1 ml Ethanol gewaschen und sodann getrocknet.

a. 2,5-Diamino-1-(4-methyl-3-thienyl)benzol-dihydrochlorid

Verwendete Bromderivat: 3-Brom-4-methylthiophen

Ausbeute: 0.025 g (90 % der Theorie)

Masspektren M^+ 205 (100)

b. 2,5-Diamino-1-(2-chlor-3-thienyl)benzol-dihydrochlorid

Verwendete Bromderivat: 3-Brom-2-chlorthiophen

Ausbeute: 0.025 g (84 % der Theorie)

Masspektren M^+ 225 (100)

c. 2,5-Diamino-1-(5-(4-nitropropenyl)-3-thienyl)benzol-dihydrochlorid

Verwendete Bromderivat: 3-Brom-5-(2-nitropropenyl)thiophen

Ausbeute: 0.025 g (70 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 276 (100)

d. 2,5-Diamino-1-(3-furyl)benzol-dihydrochlorid

Verwendete Bromderivat: 3-Brom-furan

Ausbeute: 0.025 g (90 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 175 (100)

e. 2,5-Diamino-1-(5-formyl-3-thienyl)benzol-dihydrochlorid

Verwendete Bromderivat: 3-Brom-5-formylthiophen

Ausbeute: 0.025 g (71 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 219 (100)

f. 2,5-Diamino-1-(5-hydroxymethyl-3-thienyl)benzol-dihydrochlorid

Verwendete Bromderivat: 3-Brom-5-hydroxymethylthiophen

Ausbeute: 0.025 g (71 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 221 (100)

E. Synthese von 2,5-Diamino-1-(4-aminomethyl-3-thienyl)-benzolen

0,030 g (0,0001 mol) der Verbindung aus Stufe D.e und 0,00015 mol des entsprechenden Amins werden in Methanol gelöst und mit $NaBH_4$ reduziert.

Nach Beendigung der Reaktion wird die Reaktionsmischung in 10 ml Essigsäureethylester gegossen, die organische Phase mit verdünnter Natronlauge extrahiert und sodann mit Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer abdestilliert und der Rückstand an Kieselgel mit Petrolether/Essigsäureethylester (9:1) gereinigt. Das so erhaltene Produkt wird in 4 ml Ethanol auf 50 °C erwärmt.

Anschließend werden zur Herstellung des Hydrochlorides 1,5 ml einer 2,9 molaren ethanolische Salzsäurelösung zugetropft. Der Niederschlag wird abfiltriert, zweimal mit 1 ml Ethanol gewaschen und sodann getrocknet.

a. 2,5-Diamino-1-(5-(2-hydroxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Ethanolamin

Ausbeute: 0.025 g (67 % der Theorie)

Masspektren M^+ 264 (100)

b. 2,5-Diamino-1-(5-pyrrolidinomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Pyrrolidin

Ausbeute: 0.025 g (65 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 274 (100)

c. 2,5-Diamino-1-(5-(dimethylaminoethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Dimethylaminoethylamin

Ausbeute: 0.025 g (57 % der Theorie)

Masspektren M^+ **291 (100)**

d. 2,5-Diamino-1-(5-(2-methoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2-Methoxy-5-chloranilin

Ausbeute: 0.025 g (53 % der Theorie)

Masspektren MH^+ **360 (100)**

e. 2,5-Diamino-1-(5-(3-ethoxypropyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3-Ethoxypropylamin

Ausbeute: 0.025 g (60 % der Theorie)

Masspektren MH^+ **306 (100)**

f. 2,5-Diamino-1-(5-(methoxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol - dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Methoxyethylamin

Ausbeute: 0.025 g (64 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 278 (100)

g. 2,5-Diamino-1-(5-(3,4-dimethoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3,4-Dimethoxyanilin

Ausbeute: 0.025 g (54 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 356 (100)

h. 2,5-Diamino-1-(5-(4-trifluormethyl-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Trifluormethyl-benzylamin

Ausbeute: 0.025 g (54 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 378 (100)

i. 2,5-Diamino-1-(5-(3-methoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3-Methoxyanilin

Ausbeute: 0.025 g (57 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 326 (100)

j. 2,5-Diamino-1-(5-(O,N-dimethyl-hydroxylaminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: O,N-Dimethylhydroxylamin

Ausbeute: 0.025 g (67 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 264 (100)

k. 2,5-Diamino-1-(5-(2,4-dimethoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2,4-Dimetox-5-chloranilin

Ausbeute: 0.025 g (50 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 390 (100)

l. 2,5-Diamino-1-(5-(4-phenoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Phenoxyanilin

Ausbeute: 0.025 g (50 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 388 (100)

m. 2,5-Diamino-1-(5-(2-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2-Diphenylamin

Ausbeute: 0.025 g (52 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 372 (100)

n. 2,5-Diamino-1-(5-(3,4-dimethoxybenzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3,4-Dimethoxybenzylamin

Ausbeute: 0.025 g (52 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 370 (100)

o. 2,5-Diamino-1-(5-(4-methoxyphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Methoxyanilin

Ausbeute: 0.025 g (50 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 326 (100)

p. 2,5-Diamino-1-(5-(4-hydroxy-butyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Hydroxy-butylamin

Ausbeute: 0,025 g (62 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 292 (100)

q. 2,5-Diamino-1-(5-(2-methoxy-3-fluor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Methoxy-3-fluor-anilin

Ausbeute: 0,025 g (55 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 344 (100)

r. 2,5-Diamino-1-(5-(4-(1-phenyl-ethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 1-Phenyl-ethylamin

Ausbeute: 0,025 g (58 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 324 (100)

s. 2,5-Diamino-1-(5-(2-furyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2-Furylamin

Ausbeute: 0,025 g (61 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 300 (100)

t. 2,5-Diamino-1-(5-(2-pyridyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2-Aminopyridin

Ausbeute: 0,025 g (56 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 297 (100)

u. 2,5-Diamino-1-(5-morpholinomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Morpholin

Ausbeute: 0,025 g (63 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 290 (100)

v. 2,5-Diamino-1-(5-(4-benzyl-piperazinomethyl)-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Benzyl-piperazin

Ausbeute: 0,025 g (47 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 379 (100)

w. 2,5-Diamino-1-(5-(3-carboxamid-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3-Amino-benzamid

Ausbeute: 0,025 g (56 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 339 (100)

x. 2,5-Diamino-1-(5-(N-methyl-N-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: N-methyl-N-phenylamin

Ausbeute: 0,025 g (59 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 310 (100)

y. 2,5-Diamino-1-(5-diethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Diethylamin

Ausbeute: 0,025 g (65 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 276 (100)

z. 2,5-Diamino-1-(5-(pyridin-4yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Aminomethyl-pyridin

Ausbeute: 0,025 g (55 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 311 (100)

a'. 2,5-Diamino-1-(5-(3,5-dimethoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3,5-Dimethoxy-benzylamin

Ausbeute: 0,025 g (52 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 370 (100)

b'. 2,5-Diamino-1-(5-(4-morpholino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Morpholinoanilin

Ausbeute: 0,025 g (47 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 381 (100)

c'. 2,5-Diamino-1-(5-(1-(2-hydroxyethyl))propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 1-(2-Hydroxyethyl)propylamin

Ausbeute: 0,025 g (62 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 292 (100)

d'. 2,5-Diamino-1-(5-cyclopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Cyclopropylamin

Ausbeute: 0,025 g (68 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 260 (100)

e'. N-(2-{[5-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino}-ethyl)-acetamide-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2-Aminoethylacetamid

Ausbeute: 0,025 g (60 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 305 (100)

f'. 2,5-Diamino-1-(5-cyclohexylaminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Cyclohexylamin

Ausbeute: 0,025 g (60 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 302 (100)

g'. 2,5-Diamino-1-(5-propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: propylamin

Ausbeute: 0,025 g (67 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 262 (100)

h'. 2,5-Diamino-1-(5-(o-tolyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2-Methylanilin

Ausbeute: 0,025 g (59 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 310 (100)

i'. 2,5-Diamino-1-(5-(N-methyl-N-cyclohexyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: N-methyl-N-cyclohexylamin

Ausbeute: 0,025 g (59 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 316 (100)

j'. 2,5-Diamino-1-(5-(2,6-dimethyl-morpholino)methyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2,6-Dimethyl-morpholin

Ausbeute: 0,025 g (58 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 318 (100)

k'. 2,5-Diamino-1-(5-(3,5-dimethyl-piperidino)methyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3,5-Dimethyl-piperidin

Ausbeute: 0,025 g (59 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 340 (100)

l'. 2,5-Diamino-1-(5-(3-(1-hydroxyethyl)phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3-(1-Hydroxyethyl)anilin

Ausbeute: 0,025 g (55 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 340 (100)

m'. 2,5-Diamino-1-(5-(3,4-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3,4-Dimethyl-anilin

Ausbeute: 0,025 g (58 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 324 (100)

n'. 2,5-Diamino-1-(5-(3-methylmercapto-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3-methylmercaptoanilin

Ausbeute: 0,025 g (55 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 342 (100)

o'. 2,5-Diamino-1-(5-(4-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Amino-biphenyl

Ausbeute: 0,025 g (52 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 372 (100)

p'. 2,5-Diamino-1-(5-(4-isopropyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Isopropyl-anilin

Ausbeute: 0,025 g (56 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 338 (100)

q'. 2,5-Diamino-1-(5-pentylaminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Pentylamin

Ausbeute: 0,025 g (63 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 290 (100)

r'. 2,5-Diamino-1-(5-(dibutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Dibutylamin

Ausbeute: 0,025 g (57 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 332 (100)

s'. 2,5-Diamino-1-(5-isopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Isopropylamin

Ausbeute: 0,025 g (67 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 262(100)

t'. 2,5-Diamino-1-(5-(N-Cyclopropylmethyl-N-propyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: N-Cyclopropylmethyl-propylamin

Ausbeute: 0,025 g (59 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 316 (100)

u'. 2,5-Diamino-1-(5-(4-hydroxy)piperidinomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Hydroxy-piperidin

Ausbeute: 0,025 g (60 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 304 (100)

v'. 2,5-Diamino-1-(5-(fluorenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2-Amino-fluoren

Ausbeute: 0,025 g (51 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 384 (100)

w'. 2,5-Diamino-1-(5-(4-Dimethylamino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Dimethylamino-anilin

Ausbeute: 0,025 g (52 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 339 (100)

x'. 2,5-Diamino-1-(5-(3,5-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3,5-Dimethyl-anilin

Ausbeute: 0,025 g (58 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 324 (100)

y'. 2,5-Diamino-1-(5-(4-methoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-methoxy-benzylamin

Ausbeute: 0,025 g (55 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 340 (100)

z'. 2,5-Diamino-1-(5-(indanyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 1-Amino-indan

Ausbeute: 0,025 g (56 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 336 (100)

a''. 2,5-Diamino-1-(5-(3-fluor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 3-Fluor-benzylamin

Ausbeute: 0,025 g (57 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 328 (100)

b''. 2,5-Diamino-1-(5-(benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Benzylamin

Ausbeute: 0,025 g (60 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 310 (100)

c". 2,5-Diamino-1-(5-(4-methyl-piperazino)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Methylpiperazin

Ausbeute: 0,025 g (56 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 303 (100)

d". 2,5-Diamino-1-(5-(4-tert-butyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-tert-Butylanilin

Ausbeute: 0,025 g (54 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 352 (100)

e". 2,5-Diamino-1-(5-(2-chlor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 2-chlor-benzylamin

Ausbeute: 0,025 g (55 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 344 (100)

f". 2,5-Diamino-1-(5-(napht-1-yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 1-Aminomethylnaphtalen

Ausbeute: 0,025 g (53 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 360 (100)

g". 2,5-Diamino-1-(5-(phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Anilin

Ausbeute: 0,025 g (62 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 296 (100)

h". 2,5-Diamino-1-(5-(4-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Chlor-anilin

Ausbeute: 0,025 g (57 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 330 (100)

i". 4-([5-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino)-benzoesäure-methyl-ester dihydrochlorid

Verwendetes Amin: 4-Amino-benzoesäure-methylester

Ausbeute: 0,025 g (54 % der Theorie)

Masspektren MH^+ 354 (100)

Beispiel 2: Synthese von 2-N-substituierten 2-Amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzolen (Allgemeine Synthesevorschrift)

A. Synthese von 2-Fluor-5-nitro-1-(3-thienyl)-benzol

1,75 g (0,01 mol) 1-Chlor-2-fluoro-5-nitrobenzol und 0,013 mol Thiophen-3-borsäure werden unter Argon in 70 ml 1,2-Dimethoxyethan gelöst. Anschließend werden 0,5 g Tetrakis-(triphenylphosphin)-palladium (0,0005 mol) und 13 ml 2N Kaliumcarbonat-lösung zugegeben und die Reaktionsmischung auf 80 °C erwärmt. Nach Beendigung der Reaktion wird die Reaktionsmischung in 100 ml Essigsäureethylester gegossen, die organische Phase mit verdünnter Natronlauge extrahiert und sodann mit Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer abdestilliert und der Rückstand an Kieselgel mit Hexan/Essigsäureethylester (20:1) gereinigt. Es werden 1,24 g (56 % der Theorie) 2-Fluor-5-nitro-1-(3-thienyl)-benzol mit einem Schmelzpunkt von 65 °C erhalten.

B. Synthese von 2-N-substituierten 2-Amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzolen

0,56 g (0,0025 mol) 2-Fluor-5-nitro-1-(3-thienyl)-benzol aus Stufe A und 5 ml des entsprechendenamins werden in 5 ml Ethanol gelöst.

Anschließend wird die Reaktionmischung auf 80 °C erwärmt. Nach Beendigung der Reaktion wird die Reaktionmischung in 50 g Eis gegossen, mit Essigsäureethylester extrahiert und sodann mit Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer abdestilliert und der Rückstand an Kieselgel mit Dichlormethan/Ethanol (50:1) gereinigt. Das so erhaltene Produkt wird in 30 ml Ethanol gelöst und unter Zusatz von 100 mg eines Palladium-Aktivkohle-Katalysators (10 %ig) bei 50 °Celsius hydriert. Nach Aufnahme der erforderlichen Wasserstoffmenge wird vom Katalysator abfiltriert und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert. Anschließend werden zur Herstellung des Hydrochlorides 5 ml einer 2,9 molaren ethanolischen Salzsäurelösung zugetropft. Der Niederschlag wird abfiltriert, zweimal mit 10 ml Ethanol gewaschen und sodann getrocknet.

a. 2-Dimethylamino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Dimethylamin

Ausbeute: 0,27 g (36 % der Theorie)

Schmelzpunkt: 232 °Celsius (Zersetzung) (farblose Kristalle)

CHN-Analyse:

| (C ₁₂ H ₁₆ N ₂ Cl ₂ S) | % C | % H | % N |
|--|-------|------|------|
| berechnet: | 49,48 | 5,54 | 9,61 |
| gefunden: | 48,77 | 5,84 | 9,46 |

b. 2-Pyrrolidino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Pyrrolidin

Ausbeute: 0,55 g (69 % der Theorie)

Schmelzpunkt: 205 °Celsius (Zersetzung) (farblose Kristalle)

CHN-Analyse:

| (C ₁₄ H ₁₈ N ₂ Cl ₂ S) | % C | % H | % N |
|--|-------|------|------|
| berechnet: | 52,99 | 5,72 | 8,83 |
| gefunden: | 52,00 | 5,77 | 8,60 |

c. 2-Di(2-Hydroxyethyl)amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Diethanolamin

Ausbeute: 0,14 g (16 % der Theorie)

Schmelzpunkt: 208 °Celsius (Zersetzung) (farblose Kristalle)

CHN-Analyse:

| (C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O ₂ Cl ₂ S) | % C | % H | % N |
|---|-------|------|------|
| berechnet: | 47,86 | 5,74 | 7,97 |
| gefunden: | 47,33 | 5,74 | 7,90 |

d. 2-(2-Hydroxyethyl)amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin: Ethanolamin

Ausbeute: 0,5 g (42 % der Theorie)

Schmelzpunkt: 208 °Celsius (Zersetzung) (farblose Kristalle)

CHN-Analyse:

| (C ₁₂ H ₁₆ N ₂ OCl ₂ S) | % C | % H | % N |
|---|-------|------|------|
| berechnet: | 46,91 | 5,25 | 9,12 |
| gefunden: | 46,45 | 5,43 | 9,13 |

e. 2-(2-Methoxyethyl)amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid

Verwendetes Amin 2-Methoxyethylamin

Ausbeute: 0,50 g (42 % der Theorie)

Schmelzpunkt: 208 °Celsius (Zersetzung) (farblose Kristalle)

CHN-Analyse:

| (C ₁₃ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ OS) | % C | % H | % N |
|---|-------|------|------|
| berechnet: | 48,60 | 5,65 | 8,72 |

gefunden: 48,24 6,43 8,38

f. 2-(2,3-Dihydroxypropyl)amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol-
dihydrochlorid

Verwendetes Amin 2,3-Dihydroxypropylamin

Ausbeute: 0,35 g (30 % der Theorie)

Schmelzpunkt: 208 °Celsius (Zersetzung) (farblose Kristalle)

CHN-Analyse:

| | | | |
|---|-------|------|------|
| (C ₁₃ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ OS) | % C | % H | % N |
| berechnet: | 46,3 | 5,38 | 8,31 |
| gefunden: | 44,08 | 6,07 | 8,00 |

Beispiel 2a: Synthese von 2,5-Diamino-4-methyl-1-(3-thienyl)-benzol
1,87 g (0,01 mol) 5-Chlor-2-methyl-4-nitroanilin und 0,013 mol Thiophen-3-borsäure werden unter Argon in 70 ml 1,2-Dimethoxyethan gelöst. Anschließend werden 0,5 g Tetrakis-(triphenylphosphin)-palladium (0,0005 mol) und 13 ml 2N Kaliumcarbonat-lösung zugegeben und die Reaktionsmischung auf 80 °C erwärmt. Nach Beendigung der Reaktion wird die Reaktionsmischung in 100 ml Essigsäureethylester gegossen, die organische Phase mit verdünnter Natronlauge extrahiert und sodann mit Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer abdestilliert und der Rückstand an Kieselgel mit Hexan/Essigsäureethylester (20:1) gereinigt.
Das so erhaltene Produkt wird in 30 ml Ethanol gelöst und unter Zusatz von 100 mg eines Palladium-Aktivkohle-Katalysators (10 %ig) bei 50 °Celsius hydriert. Nach Aufnahme der erforderlichen Wasserstoff-menge wird vom Katalysator abfiltriert und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert.

Anschließend werden zur Herstellung des Hydrochlorides 5 ml einer 2,9 molaren ethanolischen Salzsäurelösung zugetropft. Der Niederschlag wird abfiltriert, zweimal mit 10 ml Ethanol gewaschen und sodann getrocknet.

Ausbeute: 2,1 g (76 % der Theorie)

CHN-Analyse:

| (C ₁₁ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ S) | % C | % H | % N |
|--|-------|------|-------|
| berechnet: | 47,66 | 5,09 | 10,11 |
| gefunden: | 48,18 | 5,57 | 9,62 |

Beispiel 2b: Synthese von 2,5-Diamino-4-methoxy-1-(3-thienyl)-benzol

1,87 g (0,01 mol) 5-Chlor-2-methoxy-4-nitroanilin und 0,013 mol Thiophen-3-carbonsäure werden unter Argon in 70 ml 1,2-Dimethoxyethan gelöst. Anschließend werden 0,5 g Tetrakis-(triphenylphosphin)-palladium (0,0005 mol) und 13 ml 2N Kaliumcarbonat-Lösung zugegeben und die Reaktionsmischung auf 80 °C erwärmt. Nach Beendigung der Reaktion wird die Reaktionsmischung in 100 ml Essigsäureethylester gegossen, die organische Phase mit verdünnter Natronlauge extrahiert und sodann mit Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer abdestilliert und der Rückstand an Kieselgel mit Hexan/Essigsäureethylester (20:1) gereinigt.

Das so erhaltene Produkt wird in 30 ml Ethanol gelöst und unter Zusatz von 100 mg eines Palladium-Aktivkohle-Katalysators (10 %ig) bei 50 °Celsius hydriert. Nach Aufnahme der erforderlichen Wasserstoffmenge wird vom Katalysator abfiltriert und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert.

Anschließend werden zur Herstellung des Hydrochlorides 5 ml einer 2,9 molaren ethanolischen Salzsäurelösung zugetropft. Der Niederschlag wird abfiltriert, zweimal mit 10 ml Ethanol gewaschen und sodann getrocknet.

Ausbeute: 1,8 g (62 % der Theorie)

CHN-Analyse:

| (C ₁₁ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ OS) % C | % H | % N |
|---|------|------|
| berechnet: 45,06 | 4,81 | 9,55 |
| gefunden: 44,98 | 4,86 | 9,50 |

Beispiele 3 bis 33: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

| | |
|------------|--|
| 0,0125 mol | Entwicklersubstanz gemäß Tabelle 1 |
| 0,0125 mol | Kupplersubstanz gemäß Tabelle 1 |
| 10,0 g | Kaliumoleat (8prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,0 g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,0 g | Isopropanol |
| 0,3 g | Ascorbinsäure |
| ad 100,0 g | Wasser |

30 g der oben beschriebenen Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 30 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40° Celsius wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem Shampoo gewaschen und getrocknet. Die resultierenden Färbungen sind in der nachfolgenden Tabelle 1 zusammengefaßt.

Tabelle 1

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---------------------------------------|---|----------------------|
| 3 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 2-Amino-4-(2-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat | dunkelblau |

Tabelle 1 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---------------------------------------|---|----------------------|
| 4 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 3-Aminophenol | dunkelgrau |
| 5 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 6 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 1,3-Dihydroxybenzol | dunkelblond |
| 7 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 1-Chlor-2,4-dihydroxy-benzol | dunkelblond |
| 8 | 2,5-Diamino-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 1,3-Diaminobenzol | dunkelblau |
| 9 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 1-Naphthol | dunkelrotblau |
| 10 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 5-Hydroxy-1,3-benzodioxol | dunkelblond |
| 11 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 3-Amino-2-chlor-6-methyl-phenol | dunkelrotblau |
| 12 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 3-Amino-6-methoxy-2-(methylamino)pyridin*2HCl | dunkelblau |
| 13 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 1,3-Di-(2,4-diaminophenoxy)propan*4HCl | dunkelblau |

Tabelle 1 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|---|----------------------|
| 14 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | dunkelblau |
| 15 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 1,3-Dihydroxy-2-methyl-benzol | blond |
| 16 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 5-((2-hydroxyethyl)-amino)2-methyl-phenol | rot |
| 17 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 1,5-Dihydroxy-naphthalin | blau |
| 18 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 1,7-Dihydroxy-naphthalin | rot blau |
| 19 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 5-((2-Hydroxyethyl)-amino)-1,3-bezodioxol*HCl | dunkelblond |
| 20 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | Essigsäure-(2-methyl-naphthalin-1-yl)-ester | violet |
| 21 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl | 5,6-Dihydroxy-1H-indol | blond |
| 22 | 2-Di(2-Hydroxyethyl)-amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 2-Amino-4-(2-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat | blau |

Tabelle 1 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|---|----------------------|
| 23 | 2-Di(2-Hydroxyethyl)- amino-5-amino-1-(3- thienyl)benzol*2HCl | 3-Aminophenol | grau |
| 24 | 2-Di(2-Hydroxyethyl)- amino-5-amino-1-(3- thienyl)benzol*2HCl | 5-Amino-2-methyl- phenol | rot |
| 25 | 2-Di(2-Hydroxyethyl)- amino-5-amino-1-(3- thienyl)benzol*2HCl | 1,3-Dihydroxybenzol | blond |
| 26 | 2-Pyrrolidino-5-amino- 1-(3-thienyl)benzol *2HCl | 2-Amino-4-(2- hydroxyethyl)-amino- anisolsulfat | blau |
| 27 | 2-Pyrrolidino-5-amino- 1-(3-thienyl)benzol *2HCl | 3-Aminophenol | grau |
| 28 | 2-Pyrrolidino-5-amino- 1-(3-thienyl)benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl- phenol | rot |
| 29 | 2-Pyrrolidino-5-amino- 1-(3-thienyl)benzol *2HCl | 1,3-Dihydroxybenzol | blond |
| 30 | 2-Dimethylamino-5- amino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl | 2-Amino-4-(2- hydroxyethyl)-amino- anisolsulfat | blau |

Tabelle 1 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|---|----------------------|
| 31 | 2-Dimethylamino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 3-Aminophenol | grau |
| 32 | 2-Dimethylamino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 33 | 2-Dimethylamino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 1,3-Dihydroxybenzol | blond |
| 34 | 2-Dimethylamino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 35 | 2-Dimethylamino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 1,3-Dihydroxybenzol | blond |
| 36 | 2-(2-Hydroxyethyl)-amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 2-Amino-4-(2-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat | blau |
| 37 | 2-(2-Hydroxyethyl)amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 3-Aminophenol | grau |

Tabelle 1 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|---|----------------------|
| 38 | 2-(2-Hydroxyethyl)- amino-5-amino-1-(3- thienyl)-benzol*2HCl | 5-Amino-2-methyl- phenol | rot |
| 39 | 2-(2-Hydroxyethyl)- amino-5-amino-1-(3- thienyl)-benzol*2HCl | 1,3-Dihydroxy- benzol | blond |
| 40 | 2-(2-Methoxyethyl)- amino-5-amino-1-(3- thienyl)-benzol*2HCl | 2-Amino-4-(2- hydroxyethyl)-amino- anisolsulfat | blau |
| 41 | 2-(2- Methoxyethyl)amino-5- amino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl | 3-Aminophenol | grau |
| 42 | 2-(2- Methoxyethyl)amino-5- amino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl | 5-Amino-2-methyl- phenol | rot |
| 43 | 2-(2- Methoxyethyl)amino-5- amino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl | 1,3-Dihydroxy- benzol | blond |

Tabelle 1 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|---|----------------------|
| 44 | 2-(2,3-Dihydroxy-propyl)-amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol *2HCl | 2-Amino-4-(2-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat | blau |
| 45 | 2-(2,3-Dihydroxy-propyl)-amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 3-Aminophenol | grau |
| 46 | 2-(2,3-Dihydroxy-propyl)-amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 47 | 2-(2,3-Dihydroxy-propyl)-amino-5-amino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl | 1,3-Dihydroxy-benzol | blond |
| 48 | 2,5-Diamino-4-methoxy-1-(3-thienyl)-benzol | 2-Amino-4-(2-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat | blau |
| 49 | 2,5-Diamino-4-methoxy-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid | 3-Aminophenol | blau-grün |

Tabelle 1 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|---|----------------------|
| 50 | 2,5-Diamino-4-methoxy-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid | 5-Amino-2-methylphenol | violett |
| 51 | 2,5-Diamino-4-methoxy-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid | 1,3-Dihydroxybenzol | violett |
| 52 | 2,5-Diamino-4-methyl-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid | 2-Amino-4-(2-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat | blau |
| 53 | 2,5-Diamino-4-methyl-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid | 3-Aminophenol | grau |
| 54 | 2,5-Diamino-4-methyl-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 55 | 2,5-Diamino-4-methyl-1-(3-thienyl)-benzol-dihydrochlorid | 1,3-Dihydroxybenzol | blond |

Beispiele 56 bis 319: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

| | |
|---------------|---|
| 0,0000125 mol | Entwicklersubstanz der Formel (I) gemäß Tabelle 2 |
| 0,0000125 mol | Kupplersubstanz gemäß Tabelle 2 |
| 0,01g | Kaliumoleat (8prozentige wäßrige Lösung) |
| 0,01g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 0,01g | Ethanol |
| 0,003 g | Ascorbinsäure |
| ad 1,0 g | Wasser |

1 g der vorstehenden Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 1 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °Celsius wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem handelsüblichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Die resultierenden Färbungen sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 2:

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 56 | 2,5-Diamino-1-(5-methyl-3-thienyl)benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | dunkelblau |
| 57 | 2,5-Diamino-1-(5-methyl-3-thienyl)benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 58 | 2,5-Diamino-1-(5-methyl-3-thienyl)benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 59 | 2,5-Diamino-1-(5-methyl-3-thienyl)benzol *2HCl | Resorcin | dunkelblond |
| 60 | 2,5-Diamino-1-(2-chlor-3-thienyl)benzol*2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | dunkelblau |
| 61 | 2,5-Diamino-1-(2-chlor-3-thienyl)benzol*2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 62 | 2,5-Diamino-1-(2-chlor-3-thienyl)benzol*2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 63 | 2,5-Diamino-1-(2-chlor-3-thienyl)benzol*2HCl | Resorcin | dunkelblond |
| 64 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-nitropropenyl)-3-thienyl)benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | dunkelblau |
| 65 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-nitropropenyl)-3-thienyl)benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 66 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-nitropropenyl)-3-thienyl)benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 67 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-nitropropenyl)-3-thienyl)benzol *2HCl | Resorcin | dunkelblond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 68 | 2,5-Diamino-1-(3-furyl)benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | dunkelblau |
| 69 | 2,5-Diamino-1-(3-furyl)benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 70 | 2,5-Diamino-1-(3-furyl)benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 71 | 2,5-Diamino-1-(3-furyl)benzol *2HCl | Resorcin | dunkelblond |
| 72 | 2,5-Diamino-1-(4-formyl-3-thienyl)benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | dunkelblau |
| 73 | 2,5-Diamino-1-(4-formyl-3-thienyl)benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 74 | 2,5-Diamino-1-(4-formyl-3-thienyl)benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 75 | 2,5-Diamino-1-(4-formyl-3-thienyl)benzol *2HCl | Resorcin | dunkelblond |
| 76 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-hydroxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 77 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-hydroxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 78 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-hydroxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 79 | 2,5-Diamino-1-(4-pyrrolidinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 80 | 2,5-Diamino-1-(4-pyrrolidinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 81 | 2,5-Diamino-1-(4-pyrrolidinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 82 | 2,5-Diamino-1-(4-pyrrolidinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 83 | 2,5-Diamino-1-(4-pyrrolidinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 84 | 2,5-Diamino-1-(4-dimethylaminoethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 85 | 2,5-Diamino-1-(4-dimethylaminoethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 86 | 2,5-Diamino-1-(4-dimethylaminoethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 87 | 2,5-Diamino-1-(4-dimethylaminoethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 88 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-5-chlorphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 89 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-5-chlorphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 90 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-5-chlorphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 91 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 92 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-ethoxypropyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 93 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-ethoxypropyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 94 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-ethoxypropyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 95 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-ethoxypropyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 96 | 2,5-Diamino-1-(4-(methoxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 97 | 2,5-Diamino-1-(4-(methoxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 98 | 2,5-Diamino-1-(4-(methoxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 99 | 2,5-Diamino-1-(4-(methoxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 100 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxyphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 101 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxyphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 102 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxyphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 103 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 104 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-trifluormethyl-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 105 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-trifluormethyl-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 106 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-trifluormethyl-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 107 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-trifluormethyl-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 108 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-methoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|----------------------|
| 109 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-methoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 110 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-methoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 111 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-methoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 112 | 2,5-Diamino-1-(4-(O,N-dimethyl-hydroxylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 113 | 2,5-Diamino-1-(4-(O,N-dimethyl-hydroxylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 114 | 2,5-Diamino-1-(4-(O,N-dimethyl-hydroxylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 115 | 2,5-Diamino-1-(4-(O,N-dimethyl-hydroxylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 116 | 2,5-Diamino-1-(4-(2,4-dimethoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 117 | 2,5-Diamino-1-(4-(2,4-dimethoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 118 | 2,5-Diamino-1-(4-(2,4-dimethoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 119 | 2,5-Diamino-1-(4-(2,4-dimethoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 120 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-phenoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 121 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-phenoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 122 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-phenoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 123 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-phenoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 124 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 125 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 126 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 127 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 128 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxybenzyl)amino methyl-3-thienyl)-ben *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 129 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxybenzyl)amino methyl-3-thienyl)-ben *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 130 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxybenzyl)amino methyl-3-thienyl)-ben *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 131 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxybenzyl)amino methyl-3-thienyl)-ben *2HCl | Resorcin | blond |
| 132 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxyphenyl)aminome thyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 133 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxyphenyl)aminome thyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 134 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxyphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 135 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxyphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 136 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxybutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 137 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxybutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 138 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxybutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 139 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxybutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|----------------------|
| 140 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-3-fluorphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 141 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-3-fluorphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 142 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-3-fluorphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 143 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-3-fluorphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 144 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-(1-phenyl-ethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 145 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-(1-phenyl-ethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 146 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-(1-phenyl-ethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 147 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-(1-phenyl-ethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 148 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-furyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 149 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-furyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 150 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-furyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 151 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-furyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 152 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-pyridyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 153 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-pyridyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 154 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-pyridyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 155 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-pyridyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 156 | 2,5-Diamino-1-(4-morpholinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 157 | 2,5-Diamino-1-(4-morpholinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 158 | 2,5-Diamino-1-(4-morpholinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 159 | 2,5-Diamino-1-(4-morpholinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 160 | 2,5-Diamino-1-(4-4-benzyl-pyperazinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 161 | 2,5-Diamino-1-(4-4-benzyl-pyperazinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 162 | 2,5-Diamino-1-(4-4-benzyl-pyperazinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 163 | 2,5-Diamino-1-(4-4-benzyl-pyperazinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 164 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-carboxamid-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 165 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-carboxamid-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 166 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-carboxamid-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 167 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-carboxamid-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 168 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 169 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 170 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 171 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 172 | 2,5-Diamino-1-(4-diethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 173 | 2,5-Diamino-1-(4-diethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 174 | 2,5-Diamino-1-(4-diethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 175 | 2,5-Diamino-1-(4-diethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 176 | 2,5-Diamino-1-(4-(pyridin-4yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 177 | 2,5-Diamino-1-(4-(pyridin-4yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 178 | 2,5-Diamino-1-(4-(pyridin-4yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 179 | 2,5-Diamino-1-(4-(pyridin-4yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 180 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 181 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 182 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 183 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 184 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-morpholino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 185 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-morpholino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 186 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-morpholino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 187 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-morpholino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 188 | 2,5-Diamino-1-(4-(1-(2-hydroxyethyl))propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 189 | 2,5-Diamino-1-(4-(1-(2-hydroxyethyl))propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 190 | 2,5-Diamino-1-(4-(1-(2-hydroxyethyl))propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 191 | 2,5-Diamino-1-(4-(1-(2-hydroxyethyl))propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 192 | 2,5-Diamino-1-(4-cyclopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 193 | 2,5-Diamino-1-(4-cyclopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 194 | 2,5-Diamino-1-(4-cyclopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 195 | 2,5-Diamino-1-(4-cyclopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 196 | N-(2-{[4-(2,5-Diaminophenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino}-ethyl)-acetamide *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 197 | N-(2-{[4-(2,5-Diaminophenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino}-ethyl)-acetamide *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 198 | N-(2-([4-(2,5-Diaminophenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino)-ethyl)-acetamide *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 199 | N-(2-([4-(2,5-Diaminophenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino)-ethyl)-acetamide *2HCl | Resorcin | blond |
| 200 | 2,5-Diamino-1-(4-cyclohexylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 201 | 2,5-Diamino-1-(4-cyclohexylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 202 | 2,5-Diamino-1-(4-cyclohexylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 203 | 2,5-Diamino-1-(4-cyclohexylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 204 | 2,5-Diamino-1-(4-propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2hcl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 205 | 2,5-Diamino-1-(4-propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 206 | 2,5-Diamino-1-(4-propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 207 | 2,5-Diamino-1-(4-propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 208 | 2,5-Diamino-1-(4-(o-tolyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 209 | 2,5-Diamino-1-(4-(o-tolyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 210 | 2,5-Diamino-1-(4-(o-tolyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 211 | 2,5-Diamino-1-(4-(o-tolyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 212 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-cyclohexyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 213 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-cyclohexyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 214 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-cyclohexyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 215 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-cyclohexyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 216 | 2,5-Diamino-1-(4-(2,6-dimethyl-morpholino)methyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 217 | 2,5-Diamino-1-(4-(2,6-dimethyl-morpholino)methyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 218 | 2,5-Diamino-1-(4-(2,6-dimethyl-morpholino)methyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 219 | 2,5-Diamino-1-(4-(2,6-dimethyl-morpholino)methyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 220 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-piperidino)methyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 221 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-piperidino)methyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 222 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-piperidino)methyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 223 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-piperidino)methyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 224 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-(1-hydroxyethyl)phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 225 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-(1-hydroxyethyl)phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 226 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-(1-hydroxyethyl)phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 227 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-(1-hydroxyethyl)phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 228 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 229 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 230 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 231 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 232 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-methylmercapto-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 233 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-methylmercapto-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 234 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-methylmercapto-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 235 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-methylmercapto-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 236 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 237 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 238 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 239 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 240 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-isopropyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 241 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-isopropyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 242 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-isopropyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 243 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-isopropyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 244 | 2,5-Diamino-1-(4-pentylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 245 | 2,5-Diamino-1-(4-pentylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 246 | 2,5-Diamino-1-(4-pentylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 247 | 2,5-Diamino-1-(4-pentylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 248 | 2,5-Diamino-1-(4-(dibutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 249 | 2,5-Diamino-1-(4-(dibutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 250 | 2,5-Diamino-1-(4-(dibutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 251 | 2,5-Diamino-1-(4-(dibutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 252 | 2,5-Diamino-1-(4-isopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 253 | 2,5-Diamino-1-(4-isopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 254 | 2,5-Diamino-1-(4-isopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 255 | 2,5-Diamino-1-(4-isopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 256 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-Cyclopropylmethyl-N-propyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 257 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-Cyclopropylmethyl-N-propyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 258 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-Cyclopropylmethyl-N-propyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 259 | 2,5-Diamino-1-(4-(N-Cyclopropylmethyl-N-propyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 260 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxy)piperidinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 261 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxy)piperidinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 262 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxy)piperidinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 263 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxy)piperidinomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 264 | 2,5-Diamino-1-(4-(fluorenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 265 | 2,5-Diamino-1-(4-(fluorenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 266 | 2,5-Diamino-1-(4-(fluorenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 267 | 2,5-Diamino-1-(4-(fluorenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 268 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-Dimethylamino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 269 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-Dimethylamino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 270 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-Dimethylamino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 271 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-Dimethylamino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 272 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 273 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 274 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 275 | 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 276 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 277 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 278 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 279 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 280 | 2,5-Diamino-1-(4-(indanyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 281 | 2,5-Diamino-1-(4-(indanyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 282 | 2,5-Diamino-1-(4-(indanyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 283 | 2,5-Diamino-1-(4-(indanyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|-------------------|
| 284 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-fluor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 285 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-fluor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 286 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-fluor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 287 | 2,5-Diamino-1-(4-(3-fluor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 288 | 2,5-Diamino-1-(4-(benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 289 | 2,5-Diamino-1-(4-(benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 290 | 2,5-Diamino-1-(4-(benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 291 | 2,5-Diamino-1-(4-(benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 292 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methyl-piperazino)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 293 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methyl-piperazino)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 294 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methyl-piperazino)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methylphenol | rot |
| 295 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-methyl-piperazino)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| 304 | 2,5-Diamino-1-(4-(napht-1-yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 305 | 2,5-Diamino-1-(4-(napht-1-yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 306 | 2,5-Diamino-1-(4-(napht-1-yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 307 | 2,5-Diamino-1-(4-(napht-1-yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 308 | 2,5-Diamino-1-(4-(phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 309 | 2,5-Diamino-1-(4-(phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 310 | 2,5-Diamino-1-(4-(phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 296 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-tert-butyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 297 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-tert-butyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 298 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-tert-butyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 299 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-tert-butyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 300 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-chlor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 301 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-chlor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| 302 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-chlor-benzyl)-aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 303 | 2,5-Diamino-1-(4-(2-chlor-benzyl)-aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 311 | 2,5-Diamino-1-(4-(phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 312 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-chlor-phenyl)-aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 313 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-chlor-phenyl)-aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 314 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-chlor-phenyl)-aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2hcl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |

Tabelle 2 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|-------------------|
| 315 | 2,5-Diamino-1-(4-(4-chlor-phenyl)-aminomethyl-3-thienyl)-benzol *2HCl | Resorcin | blond |
| 316 | 4-[[4-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino]-benzoesäure-methyl-ester *2HCl | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | blau |
| 317 | 4-[[4-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino]-benzoesäure-methyl-ester *2HCl | 1-Naphtol | blau |
| 318 | 4-[[4-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino]-benzoesäure-methyl-ester *2HCl | 5-Amino-2-methyl-phenol | rot |
| 319 | 4-[[4-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino]-benzoesäure-methyl-ester *2HCl | Resorcin | blond |

Beispiele 320 bis 360: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

| | |
|--------------|---|
| 0,000625 mol | Entwicklersubstanz der Formel (I) gemäß Tabelle 3 |
| 0,000625 mol | Entwicklersubstanz gemäß Tabelle 3 |
| 0,001250 mol | Kupplersubstanz gemäß Tabelle 3 |
| 10,0 g | Kaliumoleat (8prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,0 g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,0 g | Isopropanol |
| 0,3 g | Ascorbinsäure |
| ad 100,0 g | Wasser |

30 g der vorstehenden Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 30 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °Celsius wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem handelsüblichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Die resultierenden Färbungen sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 3:

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) / Entwicklersubstanz | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|---|---------------------------|
| 320 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-benzol | 2-Amino-4-(2'-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat | dunkelblau |
| 321 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-benzol | 1,3-Dihydroxy-2-methyl-benzol | blond |
| 322 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-benzol | 5-((2-Hydroxyethyl)-amino)-1,3-benzodioxol-hydrochlorid | dunkelblond - olivgrün |
| 323 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diaminobenzol | 5-Amino-2-methyl-phenol | rotblau |
| 324 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-benzol | 3-Amino-phenol | grau |
| 325 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-benzol | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | dunkelblau |
| 326 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diaminobenzol | 1,3-Dihydroxy-benzol | blond |

Tabelle 3 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) / Entwicklersubstanz | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|---------------------------|
| 327 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-2-methyl-benzol | 2-Amino-4-(2'-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat | dunkelblau |
| 328 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-2-methyl-benzol | 1,3-Dihydroxy-2-methyl-benzol | blond |
| 329 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-2-methyl-benzol | 5-((2-Hydroxyethyl)amino)-1,3-benzodioxol*HCl | dunkelblond - olivgrün |
| 330 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-2-methyl-benzol | 5-Amino-2-methyl-phenol | violett |
| 331 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-2-methyl-benzol | 3-Amino-phenol | grau-rot |
| 332 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-2-methyl-benzol | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol | dunkelblau |
| 333 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)-benzol*2HCl / 1,4-Diamino-2-methyl-benzol | 1,3-Dihydroxy-benzol | blond |

Tabelle 3 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) / Entwicklersubstanz | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|---------------------------|
| 334 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Di(2- hydroxyethyl)amino-anilin- sulfat | 2-Amino-4-(2'- hydroxyethyl)- amino-anisolsulfat | dunkelblau |
| 335 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Di-(2-hydroxyethyl)amino- anilin-sulfat | 1,3-Dihydroxy-2- methyl-benzol | braun |
| 336 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Di-(2-hydroxyethyl)amino- anilin-sulfat | 5-((2-Hydroxy- ethyl)amino)-1,3- benzodioxol*HCl | dunkelblond - olivgrün |
| 337 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Di-(2-hydroxyethyl)amino- anilin-sulfat | 5-Amino-2-methyl- phenol | violett |
| 338 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Di-(2-hydroxyethyl)amino- anilin-sulfat | 3-Amino-phenol | grau-blau |

Tabelle 3 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) / Entwicklersubstanz | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|----------------------|
| 339 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Di-(2-hydroxyethyl)amino- anilin-sulfat | 1,3-Diamino-4-(2- hydroxyethoxy)- benzol | dunkelblau |
| 340 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Di-(2-hydroxyethyl)amino- anilin-sulfat | 1,3-Dihydroxy- benzol | blond |
| 341 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Amino-phenol | 2-Amino-4-(2'- hydroxyethyl)- amino-anisolsulfat | violett |
| 342 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Amino-phenol | 1,3-Dihydroxy-2- methyl-benzol | blond |
| 343 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Amino-phenol | 5-((2-Hydroxy- ethyl)amino)-1,3- benzodioxol*HCl | blond - olivgrün |
| 344 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Amino- phenol | 5-Amino-2-methyl- phenol | rot |

Tabelle 3 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) / Entwicklersubstanz | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|---|--|----------------------|
| 345 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Amino-phenol | 3-Amino-phenol | braun |
| 346 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Amino-phenol | 1,3-Diamino-4-(2- hydroxyethoxy)- benzol | dunkelblau |
| 347 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4-Amino-phenol | 1,3-Dihydroxy- benzol | blond |
| 348 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 2,4,5,6-Tetraamino- pyrimindin-sulfat | 2-Amino-4-(2'- hydroxyethyl)- amino-anisolsulfat | dunkelblau |
| 349 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 2,4,5,6-Tetraamino- pyrimindin-sulfat | 1,3-Dihydroxy-2- methyl-benzol | rot |
| 350 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 2,4,5,6-Tetraamino- pyrimindin-sulfat | 5-((2-Hydroxy- ethyl)amino)-1,3- benzodioxol*HCl | grau-grün |

Tabelle 3 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) / Entwicklersubstanz | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|----------------------|
| 351 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 2,4,5,6-Tetraamino- pyrimindin-sulfat | 5-Amino-2-methyl- phenol | violett |
| 352 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 2,4,5,6-Tetraamino- pyrimindin-sulfat | 3-Amino-phenol | braun |
| 353 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 2,4,5,6-Tetraamino- pyrimindin-sulfat | 1,3-Dihydroxy- benzol | hellbraun |
| 354 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4,5-Diamino-1-(2-hydroxy- ethyl)-1H-pyrazol-sulfat | 2-Amino-4-(2'- hydroxyethyl)- amino-anisolsulfat | dunkelviolett |
| 355 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4,5-Diamino-1-(2-hydroxy- ethyl)-1H-pyrazol-sulfat | 1,3-Dihydroxy-2- methyl-benzol | hellrot |

Tabelle 3 (Fortsetzung)

| Beispiel | Entwicklersubstanz der Formel (I) / Entwicklersubstanz | Kupplersubstanz | erhaltene Färbung |
|----------|--|--|----------------------|
| 356 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4,5-Diamino-1-(2-hydroxy- ethyl)-1H-pyrazol-sulfat | 5-((2-Hydroxy- ethyl)amino)-1,3- benzodioxol*HCl | braun-rot |
| 357 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4,5-Diamino-1-(2-hydroxy- ethyl)-1H-pyrazol-sulfat | 5-Amino-2- methyl-phenol | rot |
| 358 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4,5-Diamino-1-(2-hydroxy- ethyl)-1H-pyrazol-sulfat | 3-Amino-phenol | rot |
| 359 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4,5-Diamino-1-(2-hydroxy- ethyl)-1H-pyrazol-sulfat | 1,3-Diamino-4-(2- hydroxyethoxy)- benzol | violett |
| 360 | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)- benzol*2HCl / 4,5-Diamino-1-(2-hydroxy- ethyl)-1H-pyrazol-sulfat | 1,3-Dihydroxy- benzol | hellrot |

Beispiel 361: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

| | |
|--------------|---|
| 0,160 g | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl |
| 0,160 g | 1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)benzol*sulfat |
| 0,137 g | 1,3-Dihydroxy-benzol |
| 0,100 g | 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzol |
| 0,100 g | 2-Amino-5-methyl-phenol |
| 10,000 g | Kaliumoleat (8prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Isopropanol |
| 0,300 g | Ascorbinsäure |
| ad 100,000 g | Wasser |

30 g der vorstehenden Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 30 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °Celsius wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem handelsüblichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Das Haar hat eine blonde Färbung erhalten.

Beispiel 362: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

| | |
|--------------|--|
| 0,320 g | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl |
| 0,300 g | 5-Amino-2-methylphenol |
| 0,600 g | 4-Amino-3-methylphenol |
| 0,600 g | 4-Amino-phenol |
| 0,100 g | α -Naphtol |
| 0,200 g | 2-Chlor-6-(ethylamino)-4-nitrophenol |
| 10,000 g | Kaliumoleat (8prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Isopropanol |
| 0,300 g | Ascorbinsäure |
| ad 100,000 g | Wasser |

30 g der vorstehenden Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 30 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °Celsius wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem handelsüblichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Das Haar hat eine rote Färbung erhalten.

Beispiel 363: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

| | |
|--------------|--|
| 0,320 g | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl |
| 0,040 g | 5-Amino-2-methylphenol |
| 0,090 g | 2-Amino-4-(2'-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat |
| 0,030 g | 3-Aminophenol |
| 0,030 g | 1,3-Dihydroxy-benzol |
| 0,040 g | 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzol |
| 0,100 g | 4-Amino-5-methylphenol |
| 0,200 g | 2-Amino-3-methylphenol |
| 0,100 g | 2-Amino-6-methylphenol-hydrochlorid |
| 0,010 g | 4-Chlor-N-(2-hydroxyethyl)-2-nitroanilin |
| 0,020 g | 2-Amino-4,6-dinitrophenol |
| 0,100 g | 2-Chlor-6-(ethylamino)-4-nitrophenol |
| 10,000 g | Kaliumoleat (8prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Isopropanol |
| 0,300 g | Ascorbinsäure |
| ad 100,000 g | Wasser |

30 g der vorstehenden Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 30 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °Celsius

wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem handelsüblichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Das Haar hat eine braune Färbung erhalten.

Beispiel 364: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

| | |
|--------------|--|
| 0,320 g | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl |
| 0,040 g | 5-Amino-2-methylphenol |
| 0,050 g | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol |
| 0,030 g | 3-Aminophenol |
| 0,030 g | 1,3-Dihydroxy-benzol |
| 0,040 g | 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzol |
| 0,100 g | 4-Amino-5-methylphenol |
| 0,200 g | 2-Amino-3-methylphenol |
| 0,100 g | 2-Amino-6-methylphenol-hydrochlorid |
| 0,010 g | 4-Chlor-N-(2-hydroxyethyl)-2-nitroanilin |
| 0,020 g | 2-Amino-4,6-dinitrophenol |
| 0,100 g | 2-Chlor-6-(ethylamino)-4-nitrophenol |
| 10,000 g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Isopropanol |
| 0,300 g | Ascorbinsäure |
| ad 100,000 g | Wasser |

30 g der vorstehenden Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 30 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare

aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °Celsius wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem handelsüblichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Das Haar hat eine braune Färbung erhalten.

Beispiel 365: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

| | |
|--------------|--|
| 0,220 g | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl |
| 0,100 g | 1,4-Diamino-2-(2-hydroxyethyl)benzol*sulfat |
| 0,020 g | 5-Amino-2-methylphenol |
| 0,010 g | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol |
| 0,004 g | 2-Amino-4-(2'-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat |
| 0,020 g | 1,3-Dihydroxy-benzol |
| 0,040 g | 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzol |
| 0,008 g | 4-Amino-3-methylphenol |
| 10,000 g | Kaliumoleat (8prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Isopropanol |
| 0,300 g | Ascorbinsäure |
| ad 100,000 g | Wasser |

30 g der vorstehenden Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 30 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °Celsius

wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem handelsüblichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Das Haar hat eine braune Färbung erhalten.

Beispiel 366: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:

| | |
|--------------|--|
| 0,220 g | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl |
| 0,100 g | 4-Di-(2-hydroxyethyl)amino-anilin-sulfat |
| 0,020 g | 5-Amino-2-methylphenol |
| 0,010 g | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol |
| 0,015 g | 2-Amino-4-(2'-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat |
| 0,020 g | 1,3-Dihydroxy-benzol |
| 0,040 g | 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzol |
| 0,008 g | 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazol-sulfat |
| 10,000 g | Kaliumoleat (8prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Isopropanol |
| 0,300 g | Ascorbinsäure |
| ad 100,000 g | Wasser |

30 g der vorstehenden Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 30 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °Celsius

wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem handelsüblichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Das Haar hat eine braune Färbung erhalten.

Beispiel 367: Haarfärbemittel

Es werden Haarfärbelösungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt:


| | |
|--------------|--|
| 0,320 g | 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol*2HCl |
| 0,020 g | 5-Amino-2-methylphenol |
| 0,010 g | 1,3-Diamino-4-(2-hydroxyethoxy)-benzol |
| 0,015 g | 2-Amino-4-(2'-hydroxyethyl)-amino-anisolsulfat |
| 0,020 g | 1,3-Dihydroxy-benzol |
| 0,040 g | 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzol |
| 0,008 g | 4-Amino-2-(aminomethyl)phenol-dihydrochlorid |
| 10,000 g | Kaliumoleat (8prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Ammoniak (22prozentige wäßrige Lösung) |
| 10,000 g | Isopropanol |
| 0,300 g | Ascorbinsäure |
| ad 100,000 g | Wasser |

30 g der vorstehenden Färbelösung werden unmittelbar vor der Anwendung mit 30 g einer 6prozentigen Wasserstoffperoxidlösung vermischt. Anschließend wird das Gemisch auf gebleichte Haare aufgetragen. Nach einer Einwirkungszeit von 30 Minuten bei 40 °Celsius wird das Haar mit Wasser gespült, mit einem handelsüblichen Shampoo gewaschen und getrocknet. Das Haar hat eine braune Färbung erhalten.

Alle Gewichtsangaben stellen, soweit nicht anders angegeben, Gewichtsprozent dar.

Schutzansprüche

1. p-Diaminobenzol-Derivate der allgemeinen Formel (I)



worin


X gleich Sauerstoff, Schwefel, Selen oder N-R9 ist;

R1, R2, R3 und R4 unabhängig voneinander Wasserstoff, eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine C₁-C₄-Hydroxyalkylgruppe, eine C₂-C₄ Dihydroxyalkylgruppe oder eine C₁-C₄-Alkoxy-(C₁-C₂)-alkylgruppe darstellen oder R1 und R2 beziehungsweise R3 und R4 einen viergliedrigen bis achtegliedrigen aliphatischen Ring bilden, wobei mindestens 2 der Reste R1 bis R4 Wasserstoff darstellen;

R5 gleich Wasserstoff, einem Halogenatom, einer C₁-C₄-Alkylgruppe, einer C₁-C₄-Hydroxyalkylgruppe oder einer C₁-C₄-Alkoxygruppe ist;

R6 gleich Wasserstoff, einer Hydroxygruppe, einem Halogenatom, einer Cyanogruppe, einer C₁-C₄-Alkoxygruppe, einer C₁-C₆-Alkylgruppe, einer C₁-C₄-Alkylthioethergruppe, einer Mercaptogruppe, einer Nitrogruppe, einer Aminogruppe, einer Alkylaminogruppe, einer Dialkylaminogruppe, einer -C(O)H-Gruppe, einer -C(O)CH₃-Gruppe, einer -C(O)CF₃-Gruppe, einer -Si(CH₃)₃-Gruppe, einer C₁-C₄-Hydroxyalkylgruppe, einer C₃-C₄-Dihydroxyalkylgruppe, einer -CH=CHR₁₀-Gruppe, einer

$-(CH_2)_p-CO_2R_{11}$ -Gruppe oder einer $-(CH_2)_p-R_{12}$ -Gruppe mit $p=1,2,3$ oder 4 ,
 einer $-C(R_{13})=NR_{14}$ -Gruppe oder einer $C(R_{16})H-NR_{17}R_{18}$ -Gruppe ist;
R7 und R8 unabhängig voneinander gleich Wasserstoff, einem Halogenatom,
 einer Cyanogruppe, einer Hydroxygruppe, einer C_1-C_4 -Alkoxygruppe, einer
 C_1-C_6 Alkylgruppe, einer C_1-C_4 -Alkylthioethergruppe, einer Mercaptogruppe,
 einer Nitrogruppe, einer Aminogruppe, einer Alkylamino-gruppe, einer
 Dialkylaminogruppe, einer $-C(O)H$ -Gruppe, einer $-C(O)CH_3$ -Gruppe, einer
 $-C(O)CF_3$ -Gruppe, einer $-Si(CH_3)_3$ -Gruppe, einer C_1-C_4 -Hydroxyalkylgruppe,
 einer C_3-C_4 -Dihydroxyalkylgruppe, einer $-CH=CHR_{10}$ -Gruppe, einer
 $-(CH_2)_p-CO_2R_{11}$ -Gruppe oder einer $-(CH_2)_p-R_{12}$ -Gruppe mit $p=1,2,3$ oder 4 ,
 einer $-C(R_{13})=NR_{14}$ -Gruppe oder einer $C(R_{16})H-NR_{17}R_{18}$ -Gruppe sind;
R9 gleich Wasserstoff, einer C_1-C_6 -Alkylgruppe, einer C_1-C_4 -Hydroxyalkyl-
 gruppe, einer Phenylgruppe oder einer Acetylgruppe ist;
R10 gleich Wasserstoff, einer Hydroxygruppe, einer Nitrogruppe, einer
 Aminogruppe, einer $-CO_2R_{11}$ -Gruppe oder einer $-C(O)CH_3$ -Gruppe ist;
R11, R13 und R16 unabhängig voneinander gleich Wasserstoff oder einer
 C_1-C_4 -Alkylgruppe sind;
R12 gleich einer Aminogruppe oder einer Nitrilgruppe ist;
R14, R17 und R18 unabhängig voneinander gleich Wasserstoff, einer
 Hydroxygruppe, einer C_1-C_4 -Alkylgruppe, einer C_1-C_4 -Hydroxyalkylgruppe,
 einer C_3-C_4 -Dihydroxyalkylgruppe oder einem Rest der Formel (II) sind



und

R15 gleich Wasserstoff, einer Aminogruppe oder einer Hydroxygruppe ist,
 oder deren physiologisch verträgliche, wasserlösliche Salze.

2. p-Diaminobenzol-Derivat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel (I) einer oder mehrere der Reste R5 bis R8 gleich Wasserstoff sind.
3. p-Diaminobenzol-Derivat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel (I) die Reste R1, R2, R3 und R4 gleich Wasserstoff sind.
4. p-Diaminobenzol-Derivat nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel (I) R7 gleich Wasserstoff und R6 gleich Wasserstoff, -C(O)H, -C(O)CH₃, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Hydroxyalkyl ist.
5. p-Diaminobenzol-Derivate nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel (I) die Reste R7 und R6 gleich Wasserstoff sind.
6. p-Diaminobenzol-Derivat nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es ausgewählt ist aus 2,5-Diamino-1-(5-chlor-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(2-acetyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(pyrrol-3-yl)benzol; 2,5-Diamino-1-(2-formyl-3-thienyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(4-formyl-3-thienyl)-benzol; 2,5-Diamino-1-(2-formyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(4-formyl-3-furyl)benzol; 2,5-Diamino-1-(5-methyl-3-thienyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(5-methyl-3-thienyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-nitropropenyl)-3-thienyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(3-furyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(4-formyl-3-thienyl)benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2-hydroxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-pyrrolidinomethyl-3-thienyl)-benzol,

2,5-Diamino-1-(4-(dimethylaminoethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3-ethoxypropyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(methoxyethyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(4-trifluormethyl-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(3-methoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(O,N-dimethyl-hydroxylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(2,4-dimethoxy-5-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-phenoxy-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethoxybenzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxyphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxy-butyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(2-methoxy-3-fluor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-(1-phenyl-ethyl)aminomethyl-3-thienyl)-
benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(2-furyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(2-pyridyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-morpholinomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-4-benzyl-piperazinomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(3-carboxamid-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-diethylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(pyridin-4yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(4-morpholino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-(1-(2-hydroxyethyl))propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
2,5-Diamino-1-(4-cyclopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,

N-(2-{[4-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino}-ethyl)-
 acetamid, 2,5-Diamino-1-(4-cyclohexylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-propylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(o-tolyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(N-methyl-N-cyclohexyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(2,6-dimethyl-morpholino)methyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-piperidino)methyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(3-(1-hydroxyethyl)phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
 benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3,4-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
 benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(3-methylmercapto-phenyl)aminomethyl-3-
 thienyl)-benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-diphenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
 benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-isopropyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-
 benzol, 2,5-Diamino-1-(4-pentylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(dibutyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-isopropylaminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(N-Cyclopropylmethyl-N-propyl)aminomethyl-3-thienyl)-
 benzol, 2,5-Diamino-1-(4-(4-hydroxy)piperidinomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(fluorenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(4-Dimethylamino-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(3,5-dimethyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(4-methoxy-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(indanyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(3-fluor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(4-methyl-piperazino)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(4-tert-butyl-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(2-chlor-benzyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(napht-1-yl-methyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,

2,5-Diamino-1-(4-(phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 2,5-Diamino-1-(4-(4-chlor-phenyl)aminomethyl-3-thienyl)-benzol,
 4-[[4-(2,5-Diamino-phenyl)-thiophen-2-ylmethyl]-amino]-benzoesäure-
 methyl-ester und 2,5-Diamino-1-(3-thienyl)benzol.

7. Mittel zum oxidativen Färben von Keratinfasern, auf der Basis einer
 Entwicklersubstanz-Kupplersubstanz-Kombination, dadurch gekenn-
 zeichnet, daß es als Entwicklersubstanz mindestens ein Diaminobenzol-
 Derivat der Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 enthält.

8. Mittel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das
 Diaminobenzol-Derivat der Formel (I) in einer Menge von 0,005 bis 20,0
 Gewichtsprozent enthält.

9. Mittel nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die
 Kupplersubstanz ausgewählt ist aus 2,6-Diamino-pyridin, 2-Amino-4-[(2-
 hydroxyethyl)amino]-anisol, 2,4-Diamino-1-fluor-5-methyl-benzol, 2,4-
 Diamino-1-methoxy-5-methyl-benzol, 2,4-Diamino-1-ethoxy-5-methyl-
 benzol, 2,4-Diamino-1-(2-hydroxyethoxy)-5-methyl-benzol, 2,4-Di[(2-
 hydroxyethyl)amino]-1,5-dimethoxy-benzol, 2,3-Diamino-6-methoxy-
 pyridin, 3-Amino-6-methoxy-2-(methylamino)-pyridin, 2,6-Diamino-3,5-
 dimethoxy-pyridin, 3,5-Diamino-2,6-dimethoxy-pyridin, 1,3-Diamino-
 benzol, 2,4-Diamino-1-(2-hydroxyethoxy)-benzol, 2,4-Diamino-1,5-di(2-
 hydroxyethoxy)-benzol, 1-(2-Aminoethoxy)-2,4-diamino-benzol, 2-Amino-
 1-(2-hydroxyethoxy)-4-methylamino-benzol, 2,4-Diaminophenoxy-
 essigsäure, 3-[Di(2-hydroxyethyl)amino]-anilin, 4-Amino-2-di[(2-
 hydroxyethyl)amino]-1-ethoxy-benzol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-phenol,
 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-anilin, 3-[(2-Aminoethyl)amino]-anilin, 1,3-

Di(2,4-diaminophenoxy)-propan, Di(2,4-diaminophenoxy)-methan, 1,3-Diamino-2,4-dimethoxy-benzol, 2,6-Bis(2-hydroxyethyl)amino-toluol, 4-Hydroxyindol, 3-Dimethylamino-phenol, 3-Diethylamino-phenol, 5-Amino-2-methyl-phenol, 5-Amino-4-fluor-2-methyl-phenol, 5-Amino-4-methoxy-2-methyl-phenol, 5-Amino-4-ethoxy-2-methyl-phenol, 3-Amino-2,4-dichlor-phenol, 5-Amino-2,4-dichlor-phenol, 3-Amino-2-methyl-phenol, 3-Amino-2-chlor-6-methyl-phenol, 3-Amino-phenol, 2-[(3-Hydroxyphenyl)amino]-acetamid, 5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methyl-phenol, 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-phenol, 3-[(2-Methoxyethyl)amino]-phenol, 5-Amino-2-ethyl-phenol, 2-(4-Amino-2-hydroxyphenoxy)-ethanol, 5-[(3-Hydroxypropyl)amino]-2-methyl-phenol, 3-[(2,3-Dihydroxypropyl)amino]-2-methyl-phenol, 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methyl-phenol, 2-Amino-3-hydroxy-pyridin, 5-Amino-4-chlor-2-methyl-phenol, 1-Naphthol, 1,5-Dihydroxy-naphthalin, 1,7-Dihydroxy-naphthalin, 2,3-Dihydroxy-naphthalin, 2,7-Dihydroxy-naphthalin, 2-Methyl-1-naphthol-acetat, 1,3-Dihydroxy-benzol, 1-Chlor-2,4-dihydroxy-benzol, 2-Chlor-1,3-dihydroxy-benzol, 1,2-Dichlor-3,5-dihydroxy-4-methyl-benzol, 1,5-Dichlor-2,4-dihydroxy-benzol, 1,3-Dihydroxy-2-methyl-benzol, 3,4-Methylenedioxy-phenol, 3,4-Methylenedioxy-anilin, 5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-1,3-benzodioxol, 6-Brom-1-hydroxy-3,4-methylenedioxy-benzol, 3,4-Diamino-benzoesäure, 3,4-Dihydro-6-hydroxy-1,4(2H)-benzoxazin, 6-Amino-3,4-dihydro-1,4(2H)-benzoxazin, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolon, 5,6-Dihydroxy-indol, 5,6-Dihydroxy-indolin, 5-Hydroxy-indol, 6-Hydroxy-indol, 7-Hydroxy-indol und 2,3-Indolindion.

10. Mittel einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es außer dem 1,4-Diaminobenzol-Derivat der Formel (I) zusätzlich mindestens eine weitere Entwicklersubstanz, welche ausgewählt ist aus

1,4-Diaminobenzol, 2,5-Diaminotoluol, 2,5-Diaminophenylethylalkohol, 4-Aminophenol und seinen Derivaten, 4,5-Diaminopyrazolderivaten und Tetraaminopyrimidinen, enthält.

11. Mittel nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Entwicklersubstanzen und Kupplersubstanzen, bezogen auf die Gesamtmenge des Oxidationsfärbemittel jeweils in einer Gesamtmenge von 0,005 bis 20 Gewichtsprozent enthalten sind.,

12. Mittel nach einem der Ansprüche 7 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich mindestens einen direktziehenden Farbstoff enthält.

13. Mittel nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß es einen pH-Wert von 6,8 bis 11,5 aufweist.

14. Mittel nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß es in Form einer wäßrigen oder wäßrig-alkoholischen Lösung, einer Creme, eines Gels oder einer Emulsion vorliegt.

15. Mittel nach einem der Ansprüche 7 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Haarfärbemittel ist.